

R3453

v. 2

W. G. FARLOW

ASCOMYCETES LOJKANI

LECTI IN

HUNGARIA, TRANSYLVANIA ET GALICIA

AUCTORE

DRE H. REHM,

RATISBONENSI.

W. G. FARLOW.

BUDAPESTINI 1882.

SUMPTIBUS AUCTORIS.

BEROLINI APUD R. FRIEDLÄNDER & FIL.



ASCOMYCETES LOJKANI

LECTI IN

HUNGARIA, TRANSYLVANIA ET GALICIA

AUCTORE

D^{RE} H. REHM,

RATISBONENSI.

BUDAPESTINI 1882.

— SUMPTIBUS AUCTORIS. —

BEROLINI APUD R. FRIEDLÄNDER & FIL.

EX OFFICINA JOSEPHI FANDA,
Budapestini.



An te decennium fere factum est, ut Hugo Lojka, vir et mihi amicissimus et studio Lichenum praestantissimus, quoscumque Ascomycetes in itineribus per Hungariam et imprimis alpes Transsylvanas necnon per Galiciam factis, collegerat, eos mihi ad usum litterarum conferendos committeret. Sed demum longo post tempore fieri potuit, ut ex messe allata magnum Ascomycetum numerum his paginis mihi describendum esse constituerem, haud ignorans, perdifficile esse — id, quod cuivis Ascomycetum pescuratori perspicuum est, — in exquirendis et comparandis illis speciebus accedere ad veritatem. Itaque, quantum in me situm erat, spectatione microscopii ope facta comparatisque inter se diligentissime speciebus et exsiccatis et descriptis, ad veritatem accedere conatus sum.

Specimina archetypa specierum omnium descriptarum in herbario meo reposita sunt; species autem plures in *Ascomycetibus* meis *exsiccatis* distributae in collectiones cryptogamicas insignes transierunt.

Jam descriptio specierum haud prorsus systematico ordine efficitur; multo plus operae collocavi in afferendis synonymis, litteris et collectionibus exsiccatis, quaecunque usque ad hunc diem comparare et microscopii ope examinare mihi licuit. Ita quivis in posterum comparandi facultatem habebit, eo faciliorem, quod summam eorum, quae de Hymenii partibus egeram, accuratissime descriptam inveniet.

Magna copia Ascomycetum rariorum novorumque, ut dicunt, ex his regionibus prodiit magnam partem jam ab aliis auctoribus comprobatorum. Praeterea etiam illud apparet, multas species dis-

tributas esse per alpes editissimas Helveticas, Tyrolenses usque ad Transsylvanas.

Itaque valde optandum est, ut et in posterum ad amoenas illas regiones, ditissimas, ut videtur, Ascomycetum quoque, perscrutator ille, usu peritissimus et indefessus, iterum iterumque redeat, copiam novam addens collectionibus Lichenum.

Me autem etiam posthac ex studio eorum summum gaudium percepturum et in iis examinandis diligentissime elaboraturum esse, ad usum litterarum, polliceor.

Castris Reginae (Regensburg) die 15 mensis novembris 1881.

I. Discomycetes.



1. **Humaria coprinaria** (Cooke mycogr. p. 82 pl. 38, f. 149 sub Peziza).

haud dubie varietas *Humariae stercoreae* (Pers.)

Sporidia hyalina, oblonga, obtusa, 1 cellularia, glabra, 15—18/8—9; 8 monosticha in ascis cylindraccis, c. 12 mikr. lat. Paraphyses filiformes, apice sensim —6 micr. lat. clavatae ibique aurantiace granulatae. Pili peritheci fuscii, septati, glabri, acutati, simplices. Jod —

Ad fimum vaccinum in Galicia australi 1869 leg. Lojka.

Ad fimum vaccinum prope Sumjác. (Gömör) 1872 leg. Lojka sub 1866.

?Ad stercus human. Kaposvár (Somogy) Lojka 174.

Ad fimum vacc. prope Eperjes 1869. Lojka.

Ad fimum vacc. juxta introitum antri prope Ponor-Ohába (Hunyad) Transsylvaniae 1875. Lojka.

2. **Humaria tenuis** Fuckel symb. myc. p. 322 s e c. descriptionem. cfr. Cooke mycogr. pl. 30 f. 116.

ex s.: Rehm Ascomyc. 404. (u o n Fuckel f. rhen. 2209 propter defectum pilorum peritheci).

Sporidia obtuse elliptica, hyalina, glabra, nucleo magno centrali instructa, 18—21/12 - 14; monosticha in ascis cylindraccis, 15--18 mikr. lat. Paraphyses filiformes, hyalinae, sensim apice — 5 mikr. crassae. Pili perithecorum simplices, fuscii, basi bulbosi, glabri, Jod —.

In monte Aksamitka prope Szczawnica in Galicia ad terram. Lojka sub 284.

3/a. **Humaria theleboloides** (Alb. et Schw. sub Peziza) cfr. Grevillea III f. 118. Cooke mycogr. I p. 83. pl. 39 f. 151. Michelia p. 4 30.

s y n . : ? *Ascobolus granulatus* Fuckel symb. myc. p. 287.

e x s . : Rabh. f. eur. 621 (c. pilis). Phillips elv. brit. I 20. Cooke f. brit. I 571. Cooke f. brit. II 185. Fuckel f. rhen. 1876 (sub *P. granulata*). Rehm Ascomyc. 604.

Sporidia obtuse elliptica, glabra, hyalina, 1 cellularia, 15 - 18/6—8; 8 monosticha in ascis cylindraccis 120/9. Paraphyses filiformes, apice elliptice-clavatae, — 5 mikr. crassae. Jod —

Ad fimum vaccinum. Introitus antri prope Ponor-Ohába (Hunyad) Transsylvaniae. 1875 Lojka.

3/b. ***Humaria theleboides*** (Alb. et Schw. sub *Peziza*) v a r . **r u b r a** (Cooke sub *Peziza*).

s y n : *Peziza rubra* Cooke mycogr. p. 83 pl. 39 f. 152.

e x s : Cooke f. brit. I 572, II 186. Fuckel f. rhen. 2081 (sub *Peziza stercorea*).

Sporidia obtuse elliptica, glabra, hyalina, 1 cellularia, 14—18/9; 8 monosticha in ascis cylindraccis. Paraphyses apice clavatae, filiformes, hyalinae, clava elliptica — 8 mikr. crassa. Perithecia haud pileis conspicuis instructa, ut apud Cooke l. c., extus subgranulosa, crassa, in stercoris superficie longelateque aeruginose tincta, sessilia (quod idem in Fuckelii exs.). Jod —

Ad fimum vaccinum. Malomviz (Hunyad) Transsylvaniae. 1872. Lojka sub 1876, 1877.

4. ***Humaria umbrorum*** Fuckel symb. myc. p. 323.

s y n : *Peziza umbrata* Cooke hdb. p. 682. *Peziza umbrosa* Fr. c fr. Cooke mycogr. I. p. 76 pl. 33 f. 138. Nyl. pez. fenn p. 122.

e x s : Rabh. hb. myc. II 626 (sub *P. umbrosa*). Fuckel f. rhen. 2080. Phillips elv. brit. 65 (sub *P. umbrata*). Rehm Ascomyc. 555. Sydow myc. march. 150.

Sporidia obtuse elliptica, hyalina, 1 cellularia, plerumque nucleo uno magno centrali praedita, episporio verruculoso, 18—20/12; 8 monosticha in ascis cylindraccis. Paraphyses filiformes, superne — 6 mikr. crass. clavatae, fere hyalinae. Pili perithecorum longi, simplices, septati, glabri, fusci, subacuti, basi c. 12 mikr. crassi. Jod —

Ad terram prope Kaposvár (Somogy) 1871. Lojka sub 199.

5. ***Humaria luteopallens*** (Nyl. pez. fenn. p. 18 sub *Peziza*). c fr Winter in Flora 1872 p. 509. *Grevillea* III f. 72 tab. 31 f. 72. Cooke mycogr. I. p. 85 pl. 40 f. 156.

e x s : Rehm Ascomyc. 7 sub *Pyronema*.

Sporidia obtuse — elliptica, glabra, hyalina, 1 cellularia, 12—17/8—9, 8 monosticha in ascis cylindraceutis. Paraphyses filiformes, hyalinae, apice vix clavatae. Pili marginales fusciduli, obtusi, septati, glabri. Jod —.

Ad viam arenosam horti pastoris ecclesiae. Gelsendorf (Stryj) in Galicia australi 8/1869. Lojka.

6. **Pustularia cerea** (Sow. sub Peziza) Rehm. (potius fortasse var. *Pustulariae vesiculosae* (Bull sub Peziza).

syn.:? *Plicaria* — Fuckel symb. myc. p. 327. (sporarum descriptio non quadrat).

cfr: Nyl. pez. fenn. p. 13. Cooke hdb. p. 671, mycogr. I pl. 64 f. 244. Karsten myc. fenn. II p. 54. *Michelia* VI p. 164.

exs: Fuckel f. rhen. 1225. Ellis f. n. am. 135. Rehm Ascomyc. 201.

Sporidia oblonga, obtusa, glabra, unicellularia, hyalina, 15—18/9—10; 8 monosticha in ascis cylindraceutis, usque 18 mikr. crassis. Paraphyses filiformes, apice sensim usque 7 mikr. crass. clavatae, hyalinae.

Jodii ope apex ascorum valde coerulescit.

Ad terram prope Kaposvár (Somogy) 1872 Lojka sub 145.

7. **Pustularia repanda** (Wahlbg sub Peziza)

syn: *Peziza Stephensoniana* Ellis in herb. meo, quod exploravit cum explore Phillipsii in herb. meo sub *Peziza repanda* Wahlbg.

cfr. Nyl. pez. fenn. p. 14. Karsten myc. fenn. II p. 54.

non conveniunt: Cooke hdb. p. 670 (sporidia rough!), Fuckel symb. myc. p. 328 (episorium granuloso-tuberculosum fuscum), Cooke mycogr. p. 142 pl. 62 f. 240 (sporidia elliptica, binucleata, 18—20/10).

Sporidia obtusa, oblonga, hyalina, glabra, unicellularia, eucleata, 12—14/8; monosticha in ascis cylindraceutis, —12 mikr. crassis; Paraphyses paucae, hyalinae, filiformes, apice sensim 3 mikr. crass.

Jodii ope asci valde coerulescunt.

(Quum incertum apparet, quid sit vera *Peziza repanda* Wahlbergii, potius pro hac specie nomen supra allatum Ellisii sumendum erit.)

Ad terram prope Kaposvár (Somogy). 1872 Lojka sub 74.

Ad terram prope Javorina (Szepes) 1869 Lojka sub 638.

8. **Pustularia Tarzetta** (Cooke sub *Peziza* nov. spec in litt. ad me d. d. 18/III 1874)

cfr. Winter in Flora 1872 p. 425. Cooke in Grevillea II p. 176; mycogr. I p. 166 pl. 74 f. 287.

exs.: Rehm Ascomycetes 53 (sub *Peziza vesiculosa*).

Descriptio cl. Cookei l. c.: „Stipitata vel subsessilis. Cupula cyathiformis, regularis, pallens, subfarinosa, deorsum in stipitem gracile attenuata; margine leniter incurvo, laevi. Hymenio rubescente. Ascis cylindraceutis Sporidiis ellipticis, laevibus 15/7. Paraphysibus sursum incrassatis.“

Jodii ope asci non coerulescent.

Ad terram prope Kaposvár (Somogy). Lojka 5/1871 sub 118.

9. **Plectania coccinea** (Jacq. sub *Peziza*) Fuckel symb. myc. p. 324.

cfr. Karsten myc. fenn. II p. 43. Grevillea III f. 87 Cooke mycogr. I p. 55 pl. 25 f. 95. Nyl. pez. fenn. p. 11.

exs.: Fuckel f. rhen. 1213. Cooke f. brit. I 651. Phillips elv. brit. 61. Saccardo myc. Ven. 1512.

Sporidia oblongo-elliptica, hyalina, glabra, 1 cellularia, nucleo 1 parvulo praedita, 24—30/—10; 8 monosticha in ascis cylindraceutis, c. 10 mikr. crass. Paraphyses filiformes, haud clavatae, granulis rubris imbutae. Jod —.

Ad ramulum siccum. Kaposvár (Somogy) 1872 Lojka sub 31.

10. **Pyronema omphalodes** (Bull. sub *Peziza*) Fuckel symb. myc. p. 319.

syn: *Pyronema Marianum* Carus, *P. confluens* Tul., ? *P. Franzonianum* De N.

cfr. Cooke hdb. p. 676. mycogr. I p. 37 tab. 17 f. 65. Grevillea III f. 50. Karsten myc. fenn. II p. 48. Saccardo f. Ven. nov. IV p. 38. Michelia VII p. 328.

exs.: Fuckel f. rhen. 1218. Rabh. f. eur. 708 (? 267).

Sporidia oblongo-elliptica, obtusa, hyalina, glabra, 1 cellularia, 12/7; 8 monosticha in ascis cylindraceutis. Paraphyses articulatae (?), haud perspicue clavatae, c. 3 mikr. crassae. Jod —.

Ad terram limosam prope Soborsin. 7/1872 Lojka sub 1871.

12. **Helotium citrinum** (Hedw. sub *Ocetospora*) Fr. S. Veg.

syn: *Peziza* — Batsch. *Helotium lenticulare* Fuckel symb. myc. p. 315.

cfr. Nyl. pez. fenn. p. 43. Karsten myc. fenn. II p. 120. Saccardo myc. Ven. 165. Cooke hdb. p. 712 (? Fuckel symb. myc. p. 315.)

exs.: Mougeot et Nestl. stirp. Vog. 784. Rabh. f. eur. 29 a,

b. Schweiz. crypt. 118. Fuckel f. rhen. 1151 (sub *H. lenticulare*), non Fuckel f. rhen. 1152 (explr mancum in herb. meo).

Sporidia oblonga, obtusa, hyalina, 1 cellularia, duobus nucleis magnis instructa, 10—12/4; 8 monosticha, superne saepe disticha in ascis clavatis. Paraphyses filiformes, apice haud clavatae, c. 1,5 mikr. crassae. Perithecium prosenchymaticum, flavidulum. Jodii ope apex ascorum coeruleescit.

Ad ramulum fagineum decorticatum vallis „Raj“ prope Szepes-Olaszi. 1869 Lojka sub no 637.

12. **Helotium cyathoideum** (Bull. sub *Peziza*) Karsten myc. fenn. I p. 136.

syn: *Ocotospora albidula* Hedw. *Peziza* — Wahlbg. *Helotium cyathoideum* var. — Karsten myc. fenn. I p. 137. *Cyathicula vulgaris* DN. (? *Peziza Cacaliae* Pers., *Solani* Pers.)

cfr. Cooke hdb. p. 699. (? Fuckel symb. myc. p. 307.)

exs: Cooke f. brit. I 594, II 377, 378. Thümen f. austr. 1115. myc. un. 416. Phillips elv. brit. 79. Fuckel f. rhen. 1179. Kunze f. sel. 294 (sub *P. Cacaliae*), 183 (sub *P. Solani*) (? 384). Rehm *Ascomyc.* 306. Rabh. f. eur. 2207 (sub *P. Solani*) (? 224, 2408).

Sporidia oblongo-elliptica, subacuta, recta, hyalina, 1 cellularia, saepe nucleis duobus apicalibus praedita, 6—10/1,5; 8 disticha in ascis clavatis — 45/—5; paraphyses filiformes, apice vix (—2 mikr.) crassiores. Perithecium prosenchymaticum, flavidulum. Jodii ope apex ascorum coeruleescit.

a. ad caules siccas *Dipsacisylv.* prope Lunkány in Hung. 1872 Lojka.

b. ad caulem putrescentem *Aconiti* in alpe Dzurowa (Liptó) c. 5000' 1872 Lojka.

c. ad caules siccas *Heraclei palmati* infra alpem Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae c. 6000'. 1873 Lojka.

d. ad caules siccas *Artemisiae* vulg. in horto Esterházyano, Kaposvár (Somogy). 1871 Lojka.

(differt peritheciis crassioribus, fuscidulis).

13. **Helotium cyathoideum** (Bull. sub *Peziza*) Karsten myc. fenn. I p. 136. f. *dolosellum* Karsten myc. fenn. I p. 138.

Sporidia 9—12/2; Asci 45—50/5—6.

Ad caules siccas *Angelicae* prope lacum Zenoga infra alpem Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae. 1873 Lojka.

14. **Helotium glanduliforme** Rehm nov. spec. 1875.

Perithecia sparsa, cyathoidea, crasse stipitata, stipite fuscidulo,

basi subhyalino, turbinata, c. 1—1,5 mm alta, 0,5—7 mm diam., sicca margine urceolato, involuto, fusca, humida concavo-urceolata, flavidula, prosenchymatice flavide contexta, glabra, sicca extus subruguloso-striata. Asei clavati, 8 spori, 45/6; Sporidia elliptica, subobtusata, hyalina, recta, 1 cellularia, disticha, 9/2—2,5. Paraphyses filiformes, superne sensim —2,5 vel 3 mikr. crassae, ascos superantes. Jodii ope apex ascorum coerulescit.

exs: Rehm Ascomyc. 255, 559.

syn. ? *Helotium cyathoideum* (Bull). f. *multicolor* Karsten myc. fenn. p. 137.

Ad ramulos siccos *Ononidis spinosae*. Szent-Miklós in insula Danubii Csepel (Pest). Lojka sub 2001.

15. ***Helotium herbarum*** (Pers. sub. *Peziza*) Fr. S. V. Sc.

cfr Fuckel symb. myc. p. 316. Nyl. pez. fenn. p. 45. Cooke hdb. p. 714. Karsten myc. fenn. I p. 117.

exs: Moug. et Nestler st. Vog. 785. Rabh. hb. myc. II 227. f. eur. 218 (sub *P. rubi* v. *herbicola*), 810. Fuckel f. rhen. 1147. Cooke f. brit. II 391. Phillips elv. brit. 87. Kunze f. sel. 187, 572. Rehm Ascomyc. 12. Saccardo myc. Ven. 1506 (sub *H. scutula* f. *Urticae*); ? Fuckel f. rhen. 1200 (sub *P. caulicola*). ? Ellis n. am. f. 670.

f. *herbicola* Karsten myc. fenn. I p. 118.

Sporidia fusoido-elongata, subacuta, plerumque curvula, hyalina, 1—2 cellularia, 4 nucleolis praedita, 9—12/1,5; 8 disticha in ascis clavatis —65/6. Paraphyses filiformes, hyalinae. Jodii ope apex ascorum coerulescit.

Ad caules putrescentes *Umbelliferarum* prope Kaposvár (Somogy) 1871 sub 204 et 208 Lojka.

16. ***Helotium Humuli*** (Lasch sub *Peziza*) DN. in ann. critt. I p. 379.

syn: *Peziza humilis* Desm.

cfr Fuckel symb. myc. p. 308. Karsten myc. fenn. I p. 112. Saccardo myc. Ven. p. 211.

exs: Rabh. f. eur. 1185 (Jod —), 1421, hb. myc. II 221. Saccardo myc. Ven. 960 (Jod —). Rehm Ascomyc. 60. Sydow myc. march. 269.

Sporidia elongato-elliptica, plerumque acutata, recta vel subcurvata, hyalina, 1 cellularia, nucleis 2—4 magnis instructa; 15—18/4; 8 disticha in ascis clavatis —80/9. Paraphyses filiformes, superne —2,5 mikr. incrassatae. Jodii ope apex ascorum coerulescit.

Ad sarmenta sicca *Humuli Lupuli* in vinetis prope Kaposvár (Somogy) 1870 Lojka in Rehm Ascomyc.

17. **Helotium Urticae** (Pers. sub Peziza) Karsten myc. fenn. I p. 133.

syn: Peziza striata Fr. P. Cacaliae f. Senecionis Fuckel symb. myc. p. 307. P. Cacaliae Sacc. in Michelia I p. 42.

cfr Nyl. pez. fenn. p. 39. Fuckel symb. myc. p. 307.

exs: Thümen f. austr. 1116 (sub Cyathicula De N.), myc. un. 1811 (sub H. Cacaliae var. Amaranthi Sacc.). Rehm Ascomyc. 59. (? Fuckel f. rhen. 1180, 2283 sub P. Cacaliae f. Senecionis; Rabh. f. eur. 221).

Sporidia elongato-fusiformia subobtusa, plerumque recta, hyalina, 1 cellularia, 8—9/2; 8 disticha in ascis clavatis, 50/6; Paraphyses filiformes. Jodii ope apex ascorum coerulecit.

a. Ad caules putridas Umbelliferarum in horto Esterházyano Kaposvár (Somogy) 1871 Lojka in Rehm Ascomyc.

b. Ibidem ad caules putr. Lapparum. 1871 Lojka.

c. Ibidem ad caulem Daturae Stramonii 1871 Lojka sub 117 c.

d. Ad caules putridas Polygoni Persicariae prope Malomviz in Transsylv. 1872. Lojka.

18. **Helotium virgultorum** (Vahl sub Peziza) Fr. syst.

cfr Fuckel symb. myc. p. 314. Nyl. pez. fenn. p. 37, 38. Karsten myc. fenn. I p. 109.

f. fructigenum (Bull. sub Peziza).

cfr Karsten myc. fenn. I p. 113 (? Cooke hdb. p. 709, sporae acicular-oblong!)

exs: Fuckel f. rhen. 1154. Rabh. hb. myc. II 510 (? 121), Thümen f. austr. 929. Cooke f. brit. I 479, II 392. Kunze f. sel. 386. Rehm Ascomyc. 9, 10.

Sporidia elongato-fusiformia, recta vel subcurvata, 1 cellularia, plerumque nucleis 2 magnis praedita, hyalina, 15—18/4,5—5; 8 disticha in ascis clavatis, tenuibus, apice subincrassatis, 100'—12; Paraphyses filiformes, apice sensim — 3 mikr. crassae. Jodii ope apex ascorum coerulecit.

Ad dejectos fructus quercinos. Gelsendorf (Galicia australis) 1869 Lojka.

19. **Helotium virgultorum** (Vahl sub Peziza) Fr.

var. scutula (Pers. sub Peziza) Karsten myc. fenn. I p. 110.

cfr ? Fuckel symb. myc. p. 308.

exs: Fuckel f. rhen. 2477. Rabh. f. eur. 2105. Rehm Ascomyc. 56 (? Saccardo myc. Ven. 728. Phillips elv. brit. 120a).

Sporidia elliptica, plerumque una apice obtusata, recta vel subcurvata, 1 cellularia, plerumque nucleis 2 magnis praedita, hyalina, 18—21/4—5; 8 disticha in ascis clavatis, 90/8. Paraphyses filiformes, hyalinae. Jodii ope apex ascorum coerulecit.

Ad caules putridas Artemisiae vulg. in horto Esterházyano. Kaposvár (Somogy) 1871 Lojka in Rehm Ascomycet.

21. **Leucoloma convexellum** (Karsten myc. fenn. I p. 64 sub Peziza) Rehm.

cfr Cooke mycogr. I p. 22 pl. 9 f. 35.

Sporidia globosa, hyalina, glabra, 12—14 mikr. diam. 8 monosticha in ascis cylindraceutis c. 16 mikr. crass. Paraphyses filiformes, apice curvatae et sensim 3 mikr. crassae. Jod —.

In excavatione terrae vallis „Riu mare“ infra alpem Retezát Transsylvaniae. 8/1872 Lojka sub 1870.

21. **Leucoloma tetrasporum** Fuckel symb. myc. p. 317.

syn: Ascobolus—Fuckel in Hedwigia 1866 p. 4 t. 5 f. a—c.; Peziza—Cooke in Grevillea III f. 82.

cfr ? Cooke mycogr. I p. 27 pl. 12 f. 45. (delineatio sporum et paraphysum non quadrat, sporae —35/10).

exs: ? Fuckel f. rhen. 1856 (nimis mancum explr herb. mei).

Sporidia elliptica, obtusa, glabra, hyalina, 1 cellularia, nucleo magno 1 (rarius 2) centrali instructa, 18—20/10; 4 monosticha in ascis cylindraceutis c. 105/12; Paraphyses filiformes, guttulis rubescentibus repletas, apice 7—8 mikr. crassa clava praeditas. Jod —.

Ad terram. Kaposvár (Somogy). 10/1871 Lojka sub 211.

(Species valde dubia, nempe in sporidiorum saepe abortivorum numero condita.)

22. **Dasyscypha calycina** (Schum. sub Peziza) Fuckel symb. myc. p. 305.

syn: Helotium—Karsten myc. fenn. I p. 154. Nyl. pez. fenn. p. 24.

Sporidia obtusa, elliptica, glabra, 1 cellularia, hyalina, 9/5; 8 1—1¹/₂ sticha in ascis clavatis 90/7—9. Paraphyses filiformes, guttulatas, apice vix crassiores.

Ad ramulos Pini Pumilionis; Válye-Rásza infra montem Retezát Transsylvaniae. 8/1872 Lojka.

Exemplaria manca, itaque dubie ad hanc speciem allata.

23. **Dasyscypha chrysothralma** (Pers. sub Peziza) Rehm.

syn: Helotium—Karsten myc. fenn. I p. 155. Peziza calycina β Abietis Fr. Syst. Peziza pulchella β flavococcinea Alb. et Schw

Pithya suecica Fuckel symb. myc. Nachtrag III p. 32. (minime = *P. chrysophthalma* Gerard, cfr *Hedwigia* 1874 p. 29).

cfr Nyl. pez. fenn. p. 34. *Grevillea* III p. 127 tab. 40 f. 168, IV p. 41.

exs: Rehm *Ascomyc.* 108 (sub *Pithya*). Thümen f. austr. 1213. Fuckel f. rhen. 2686 (sub *P. suecica*).

Sporidia globosa, hyalina, glabra, 1 cellularia, 4—5 mikr. crassa, 8 monosticha in ascorum cylindraceorum parte superiore, c. 60/6. Paraphyses filiformes. Jod —

Ad ramulos Pini Pumilionis. Tatra „Hintere Leithen“ c. 5500. 9/1869. leg. Lojka sub 277.

24. ***Dasyscypha coerulescens*** Rehm nov. spec. 1873.

Perithecia gregaria, sessilia, primitus globosa, dein urceolata, denique applanata, margine spurio circumdata, coerulescentia, c. 0,5—6 mm diam. prosenchymatice contexta, pilis brevibus, scabris, obtusis, simplicibus, 4—6 mikr. crassis obsessa. Asci clavati, 24—30/3—4, 8 spori. Sporidia oblongata, obtusa, 1 cellularia, hyalina, 4—5/1, disticha. Paraphyses simplices, filiformes, tenerae, haud clavatae Jodii ope apex ascorum dilute coerulescit.

Ad corticem *Betulae* prope Chodowice (Stryj) Galiciae australis. Lojka sub 41.

25. ***Dasyscypha lanata*** Rehm nov. spec. 1879.

Perithecia aperta, explanata, sessilia, solitaria, sicca corrugata, humida disco flavo plano, extus hirta, alba, parenchymatice flavide contexta, pilis septatis, hyalinis, glabris, simplicibus, obtusis, longis, c. 4 mikr. crass. obsessa, — 1,2—5 mm diam. Asci clavati, 8 spori, 60/4. Sporidia bacilliformia, obtusa, recta vel subcurvata, 1—2 cellularia, 9—15/1—1,5, hyalina, disticha. Paraphyses filiformes, tenerae, apice, subincrassatae. Jodii ope apex ascorum coerulescit.

Ad caules putrescentes *Aconiti Napelli* infra alpem Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae. Lojka.

Species videtur propria, ad *Dasysc. leucophaeam* vergens.

26. ***Dasyscypha leucophaea*** (Pers. sub *Peziza*) Rehm.

syn: *Lachnum*—Karsten myc. fenn. I p. 177. *Trichopeziza sulphurea* Fuckel symb. myc. p. 296. (? *Peziza sulphurea* Fr. syst. myc. II p. 104.)

cfr Cooke hdb. p. 689. Nyl. pez. fenn. p. 31. Saccardo f. Ven. IV p. 34. *Michelia* VI p. 79. [sec. Saccardo differt a *Tr. sulphurea* (Fr.) Fuckel.]

exs: Rabh. hb. myc. II 707 (sub *P. sulphurea*); Fuckel f.

rhen. 1196. Cooke f. brit. II 372. Phillips elv. brit. (? 25) 166. Saccardo myc. Ven. 1518 (sub *Tr. sulphurea*). Rehm Ascomyc. 65 *a*, *b*. (? Thümen myc. un. 1812). *Perithecia* prosenchymatica, flavidula, pilis flavis, septatis, scabris, c. 4,5 mikr. crassis obsessa; Asci cylindraceo-clavati c. 60/5, 8 spori. Sporidia recta vel subcurvata, elongato-elliptica, subobtusata, 1 cellularia, hyalina, 9—14/1, 5—2 disticha. Paraphyses lanceolato-acuminatae, ascos superantes, c. 4 5 mikr. crass. Jodii ope apex ascorum coerulecit.

a. Ad caules putridas Umbelliferarum in horto Esterházyano prope Kaposvár (Somogy) Lojka 1871. (edita in Rehm Ascomyc. 65 *a*!)

b. Ad caules putridas Conii maculati. Malomviz (Hunyad) Transsylvaniae 8/1873. Lojka.

27. *Dasyscypha leucostoma* Rehm.

Perithecia gregaria, sessilia, globosa, urceolata, extus fusco-brunnea vel fusconigra, hirta, ore connivente albo ex fibris hyalinis constituto, humidata aperta, disco dein conspicuo concavo pallido, c. 0,4 mm diam., prosenchymatice fusce contexta, pilis longis, fuscidulis, obtusis, subscabris, simplicibus, c. 3 mikr. crassis obsessa. Asci cylindraceo-clavati, apice incrassati 60—90/5, 8 spori. Sporidia oblonga vel subfusiformia, plerumque recta, 1 cellularia, hyalina, 9—16 1,5—2, disticha. Paraphyses filiformes, apice haud clavatae. Jodii ope apex ascorum coerulecit.

exs: Rehm Ascomyc. 205 *a*, *b* (sub *Tapesia*); Thümen myc. un. 610.

a Ad caules putridas Aconiti Napelli aliarumque herbarum circa lacum Zenoga infra montem Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae, c. 6000' alt. 8/1873 Lojka (edita in Rehm Ascomyc. 205 *a*). **Locus primarius!**

b. ibidem in alpe Dzurowa (Liptó) alt. c. 5000! 1872 Lojka.

Species distinctissima et ab illo tempore in Alpibus editissimis Tyrolensibus et Helveticis saepe reperta.

28. *Dasyscypha mollissima* (Lasch sub *Peziza*) Rehm.

syn: *Lachnum* — Karsten myc. fenn. I p. 147.

cfr: Nyl. pez. fenn. p. 31.

exs: Rabh. hb. myc. II 708. Kunze f. sel. 567.

Exemplar dubium, quoad *Hymenium* plane inevolutum et immaturum.

Ad caules putridas Conii maculati in horto Esterházyano Kaposvár (Somogy) 5/1871 Lojka.

29. **Dasyscypha relicina** (Fr. sub Peziza).

syn: Trichopeziza — Fuckel symb. myc. p. 296. Lachnum — Karsten myc. fenn. I p. 182. Peziza Atropae Pers. sec. Rabh. D. crypt. Flora I p. 358. Excipula phaeotricha Rabh.

cfr. Michelia VI p. 164 (sporidia 8—10/1—1,5).

exs: Fuckel f. rhen. 1197. Moug. et Nestler stirp. Vog. 686 (sub P. Atropae). Rabh. hb. myc. II 515. Rehm Ascomyc. 204.

Perithecia prosenchymatica, fuscidula, pilis septatis, glabris, apice obtusis, fuscis, c. 6 mikr. crassis, longis obsessa. Asci clavati, apice incrassati, 8 spori, 60—70/6—8. Sporidia oblonga, obtusa, recta vel subcurvata, hyalina, 1 cellularia, 12—15/2, 5—3, disticha. Paraphyses lanceolatae, apice acuminatae, c. 2,5 mikr. crassae, ascos superantes. Jodii ope apex ascorum coerulecit.

Ad caules putridas Aconiti circa lacum Zenoga infra montem Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae alt. c. 6000'. 8/1873 Lojka.

Edita in Rehm Ascomyc. 204.

30. **Dasyscypha resinaria** (Cooke et Phillips sub Peziza).

cfr. Grevillea III p. 185. Winter in Flora 1872 p. 425.

exs: Phillips elv. brit. 66. Rehm Ascomyc. 55 (sub Pithya chrysophthalma).

Perithecia prosenchymatica, hyalina, pilis hyalinis, scabris, simplicibus, c. 4 mikr. crassis obsessa; Asci clavati, 30—36/4, 8 spori. Sporidia subrotunda, 1 cellularia, hyalina, 2,5 2, disticha. Paraphyses filiformes, c. 1,5 mikr. crassae. Jodii ope apex ascorum coerulecit.

Ad corticem abietis in regione „Male Brunowo“ infra alpem Kralowa Hola prope Teplicska (Liptó) 8/1872 Lojka.

31. **Dasyscypha villosa** (Pers. syn. f. p. 655 sub Peziza).

syn: Trichopeziza — Fuckel symb. myc. p. 296. Cyphella — Karsten myc. fenn. I p. 175, III p. 325. Peziza syringea Wallr. Trichopeziza nivea Fuckel symb. myc. p. 296. (? Cyphella pezizoides Zopf in myc. march. no 1 sec. icon).

cfr Nyl pez. fenn. p. 32. Saccardo myc. Ven. p. 163 Cooke hdb. p. 690.

exs: Rabh. f. eur. 616 a, b (sub P. nivea), Fuckel f. rhen. 1199 (sub P. nivea); Rabh. hb. myc. II 225, 705 (sub nivea), f. eur. 32 (sub syringea), Thümen myc. un. 1608 (non Fuckel f. rhen. 1193 (sub P. Aspidii), quam Fuckel l. all. citat, nec f. rhen. 2286.)

Perithecia prosenchymatica, hyaline contexta, pilis longis, obtusis, scabris, hyalinis, septatis, c. 5 mikr. crassis obsessa. Hyme-

nium sine ascis et sporidiis. Vix inter Ascomycetes collocanda species!

a. ad caules siccas Umbelliferarum prope Soborsin in Hungaria 7/1872 Lojka.

b. ad sarmenta vini et ramulos sambucinos putrescentes. Kaposvár (Somogy) 5/1871 Lojka.

c. ad caules putrescentes Ononidis spinosae. Szent-Miklós in insula Danubii Csepel (Pest). 1873 Lojka sub 2001.

32. **Tapesia fusca** (Pers. sub Peziza) Fuckel symb. myc. p. 302.

syn: Mollisia — Karsten myc. fenn. I p. 207 (? Niptera livido-fusca Fr. sub Peziza —, cfr Nyl. pez. fenn. p. 61). Fucke symb. myc. Nachtrag II p. 58.)

exs: Rabh. hb. myc. II 306. Fuckel f. rhen. 1173 (sub *P. vulgaris*), 1595, 2573 (sub *Niptera lividofusca*). Rehm Ascomyc. 153 (? Phillips elv. brit. 77, Cooke f. brit. II 556,654).

Asci clavati, apice incrassati, —60/7—8, 8 spori, Sporidia oblongata, obtusa, 1 cellularia, hyalina, 9—11/3, disticha. Paraphyses filiformes, superne sensim — 3 mikr. crassae. Jodii ope apex ascorum coerulescit.

Ad ramum putridum Pini Cembrae prope lacum Zenoga (Hunyad) in Transsylv. Lojka 1873 sub 2412 ††.

33. **Tapesia byssina** Fuckel symb. myc. p. 302.

syn ? Peziza melaleuca Fr. f. byssina.

exs: Rehm Ascomyc. 153 *b* (sub *Tapesia fusca*).

Asci clavati, 50/6, 8 spori. Sporidia oblonga vel ovoidea, obtusa, 1 cellularia, hyalina, 9—11/3, 1½ sticha. Paraphyses hyalinae, filiformes. Jodii ope apex ascorum coerulescit.

Ad lignum putridum prope Kaposvár (Somogy) 1872. Lojka sub 167.

Forsitan forma bysso deficiente diversa a: *Niptera melaleuca* (Fr. sub Peziza) Fuckel symb. myc. p. 292. syn: *Patellaria* — Fr. S. Veg. cfr Nyl. pez. fenn. p. 60 adn. Saccardo f. Ven. nov. IV p. 31. ? *Michelia* VI p. 81. exs: Fuckel f. rhen. 2284.

34. **Pezizella Aconiti** Rehm nov. spec. 6,9 1873.

Perithecia gregaria, sessilia, orbicularia, primitus subglobosa, urecolata, dein plus minusve expansa, sicca albido-rosea, extus scabra; disco roseo; humida dilatata, margine crasso, albido, denticulato cincta, roseo-cinerea, disco plano, prosenchymatice tenerrime, subhyaline contexta, c. 3—5 mm diam. Asci clavati, apice incrassati,

8 spori, 45—50/7; Sporidia subelliptica, obtusa, 1 cellularia, 2 — plerumque 4 nucleata, recta vel subcurvata, hyalina, disticha, 12 - 14/2,5—3. Paraphyses filiformes, tenerae, hyalinae. Jodii ope apex ascorum coerulecit.

exs: Rehm Ascomyc. 163.

Ad caules putridas Aconiti Napelli in alpe Dzurowa prope Teplicska (Liptó) alt. c. 5000' Lojka 8 1873 sub 1378.

Edita in Rehm Ascomyc. 163.

35. **Pezizella Hungarica** Rehm nov. spec.

cfr. Winter in Flora 1872 p. 526.

Perithecia minutissima, c. 0,3 mm diam., gregaria, sessilia, primitus globosa, dein urceolata, sicca flavidula, humectata hyalinella, prosenchymatice contexta. Asci clavati, 8 spori, 30/4. Sporidia elongato-cuneiformia, recta, 1 cellularia, hyalina, obtusa, 5—7/1,5, disticha. Paraphyses tenerae, filiformes. Jodii ope apex ascorum coerulecit.

exs. Rehm Ascomyc. 64.

a. Ad caules putridas Umbelliferarum in horto Esterházyano Kaposvár (Somogy) 1871 Lojka.

Edita in Rehm Ascomyc. 64.

b. Ad caulem putridam Heraclei palmati infra montem Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae alt. c. 6000' 1873 Lojka.

(differt sporidiis p. p. subcurvatis, 6—8/1, paraphysibus apice globosa clava c. 3 mikr. crassa instructis).

36. **Pezizella Tyrolensis** Rehm nov. spec.

Perithecia plerumque sparsa, rarius gregaria, sessilia, primitus globosula, dein substipitata, serius explanata, sicca juniora aureo-vel aurantiaco-flavida, scabra, concava, plicata, margine subfimbriato et rugoso, dein explanata, disciformia, haud distincte marginata, margine albido-fimbriata, humida flavida, expansa, prosenchymatice flavidule contexta, — 1 (vel 1,2) mm diam. Asci clavati, apice incrassati, 8 spori, 40—60/6—8. Sporidia oblonga vel obtuse oblongata, elliptica, hyalina, recta, 1 cellularia, saepe 1—2 nucleolis praedita, 6 - 9/2,5; Paraphyses filiformes, apice haud clavatae, hyalinae, p. p. crassae ascosque superantes, c 2 mikr. diam. Jodii ope apex ascorum coerulecit.

exs: Rehm Ascomyc. 116. Thümen myc. un. 516.

Ad caules putridas Angelicae circa lacum Zenoga infra alpem Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae 1873 Lojka.

(Forsitan et *Pezizella Hungarica* Rehm huc pertinet).

Species distinctissima et per omnes alpes editiores juxta glaciem aeternam distributa.

37. **Niptera cinerea** (Batsch sub Peziza) Fuckel symb. myc. p. 292.

syn: Peziza callosa Bull. P. salicaria Pers. Trochila — De N. Mollisia cinerea Karsten myc. fenn. I p. 189.

cfr. Nyl. pez. fenn. p. 60,61**. Cooke hdb. p. 701. Saccardo myc. Ven. p. 162. Michelia I p. 424.

exs: Rehm Ascomyc. 66 (sub Pyrenopeziza Artemisiae). (non = Saccardo myc. Ven. p. 371). Mollisia complicata Karsten myc. fenn. I p. 192 ut videtur).

Perithecia parenchymatice fusca. Asci clavati, 45–50/5; 8 spori. Sporidia obtusa, elongato-elliptica recta vel subcurvata, 1 cellularia, utraque apice nucleo parvulo instructa, hyalina, 7–9/1,5–2, disticha; Paraphyses filiformes, hyalinae, apice paullulum crassiores. Jodii ope apex ascorum coerulecit.

a. Ad caules siccas Artemisiae vulg. in horto Eszterházyano Kaposvár (Somogy) 1871 Lojka.

Edita in Rehm Ascomyc. 66.

b.? Ad lignum siccum. Gelsendorf (Stryj) Galiciae austr. Lojka.

38. **Niptera cinerea** (Batsch) Fuckel l. c. f. atrocinerea Cooke sec. Ellis in herb. meo.

exs: Kunze f. sel. 179,382. Rabh. f. eur. 1643.

Asci clavati 24–30,5, 8 spori; Sporidia elongato-cuneiformia, 1 cellularia, hyalina, 6,1,5, disticha. Paraphyses filiformes, apice vix incrassatae. Jodii ope apex ascorum coerulecit.

Ad caules siccas Dipsaci sylv. prope Lunkány in Hung. 1872 Lojka.

39. **Niptera Ligni** (Desm. sub Cenangium) Rehm.

syn: Trochila — De N. Mollisia — Karsten myc. fenn. I p. 204. (? Pyrenopeziza — Sacc. f. Ven. nov. IV p. 33).

exs: Rehm Ascomyc. 413 (sub Tapesia fusca v. Myricariae). cfr. Beiträge des naturhist. Vereines zu Augsburg 1877 p. 60.

Perithecia parenchymatice fusca. Asci clavati, 8 spori 40–45/6; Sporidia elliptica, recta vel subcurvata, obtusiuseula, 1 cellularia, hyalina, 6–9 2, disticha. Paraphyses filiformes, haud clavatae. Jod —

Ad lignum mortuum corylinum. Kaposvár (Somogy) 1872 Lojka sub 67.

40. **Niptera plicata** Rehm nov. spec. 1878.

exs: Rehm Ascomyc. 570.

Perithecia solitaria vel gregaria, sessilia, primitus sphaeroidea, subclausa, dein urceolata, sicca plicata, fusco-cervina, margine tenui, albido, subdilacerato cincta; disco livido albo, parenchymatice fuscidule contexta, — 1 mm diam., orbicularia. Asci clavati, apice incrassati, 8 spori, 45–60,6–9. Sporidia elliptica, plus minusve obtusa, recta vel subincurvata, 1 cellularia, hyalina, disticha, 9–12/2–3. Paraphyses obtuse lanceolatae, plus minusve ascos superantes, 4–5 mikr. diam., hyalinae. Jodii ope apex ascorum coerulescit.

Ad caules siccas Angelicae infra alpem Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1877 Lojka

41. **Niptera Polygoni** (Cooke sub *Peziza atrata* f. —) Rehm 1871. syn: *Peziza* (*Mollisia*) *luctuosa* Cooke.

cfr. Winter in *Flora* 1872 p. 542. Cooke in *Hedwigia* 1875 p. 83 no 14.

exs: Rehm *Ascomyc.* 70 *a, b, c.* Cooke f. brit. I 284. Thümen f. austr. 1011. Ellis n. am. f. 442. (? Rabh. f. eur. 1117, Phillips elv. brit. 174).

Sporidia elongato-cunoidea, obtusa, recta vel subcurvata, hyalina, 1 cellularia, 5–8/2, 8 disticha in ascis clavatis, apice incrassatis, 30–40/5–6; Paraphyses filiformes, 1,5–2 mikr. crassae, haud clavatae. Jodii ope apex ascorum valde coerulescit.

a. Ad caules putridas *Polygoni* in horto Esterházyano Kaposvár, (Somogy). 5/10 1871 Lojka.

Edita in Rehm *Ascomyc.* 70*a.*

b. ibidem prope Malomviz (Hunyad) Transsylvaniae 8/1872 Lojka sub 1885.

Edita in Rehm *Ascomyc.* 70*b.*

42. **Niptera Vitis** Rehm (sub *Pyrenopeziza* —) 1871!

cfr. diagnosin cl. Winterii in *Flora* 1872 p. 526.

syn: *Peziza ampelina* Passerini 1874!

exs: Rehm *Ascomyceten* 67. Rabh. f. eur. 1706

Sporidia obtuse conoidea, unicellularia, hyalina, 8/2,5, 8 disticha in ascis clavatis, apice incrassatis, 36.6. Paraphyses hyalinae, filiformes. Perithecia parenchymatice fusce contexta. Jodii ope apex ascorum coerulescit.

Ad corticem trunci *Vitis viniferae* in sylva Kislakensis prope Kaposvár (Somogy) 7/1871 Lojka sub 122. Videtur potius forma *Nipterae atratae* (Pers)!

Edita in Rehm *Ascomyceten* 67.

43. **Pseudopeziza rosella** Rehm nov. spec.

Perithecia sessilia, gregaria, minutissima, in maculis epidermidis flavidulis plerumque insidentia, orbicularia, plana, margine fuscidulo cincta, disco rosello, basi parenchymatice flavidule contexta, c. 0,2 mm diam. Asci clavati, apice incrassati, 8 spori, 45/9. Sporidia obtusa, oblonga, 1 cellularia, hyalina, disticha, 9/2,5–3. Paraphyses superne dichotomae et subincurvatae, haud incrassatae, laxae, hyalinae. Jodii ope apex ascorum violascit.

Ad caules putrescentes Aconiti Napelli. Arágyes infra alpem Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1874 Lojka.

44. **Micropeziza Iridis** Rehm nov. spec. 1873.

Perithecia sicca oblonga vel rotundata, plus minusve hemisphaerice contracta, humida concava vel explanata, sessilia, gregaria, subfusca, margine viridiflavo cincta, parenchymatice fusce contexta, disco fuscidulo, c. 0,3 mm diam. Asci clavati, apice incrassati, 50/9; 4–8 spori. Sporidia elliptico-elongata, haud acuminata, recta, 1 cellularia, nucleis magnis 1–4 praedita, disticha, 18 21/4. Paraphyses filiformes, hyalinae, superne sensim – 3,5 mikr. incrassatae. Jodii ope apex ascorum coerulescit.

exs: Rehm Ascomyceten 161.

Ad caules et folia sicca Iridis spuriae prope Tököl in insula Danubii Csepel (Pest) Lojka sub 1988.

Edita in Rehm Ascomyc.

45. **Habrostictis diaphana** Rehm nov. spec.

Perithecia aurantiaca, primitus immersa, dein sessilia, plane ut in Calloria fusarioide, parenchymatice, dilute flavidule contexta, hyphis teneribus, hyalinis, brevibus insidentia. Asci clavati, apice incrassati, c. 50–70,9–12, 4–8 spori; Sporidia obtuse oblonga, 1 — demum 2 cellularia, hyalina, 10–12/4–5; transverse 1½-sticha. Paraphyses filiformes, superne clavula elliptica, hyalina, c. 3 mikr. crassa instructae. Jodii ope apex ascorum violascit.

exs: Rehm Ascomyc. 118 (sub Calloria fusarioides var. alpigena), 210. Thümen f. austr. 1113, myc. un. 719.

Ad caules siccas Angelicae prope lacum Zenoga infra alpem Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae c 6000'. Lojka 8/1873.

Edita in Rehm Ascomyc. 210.

46. **Habrostictis ocellata** (Pers. sub Peziza) Fuckel.

syn: Stictis — Fr. Tul. Peziza Lecanora Schm. et Kze. Stictis — Fr. syst. Propolis — et Populi De N. Phacidium Populi Lasch. Ocellaria aurea Tul. O. parvula Speg.

cfr Cooke hdb. p. 735. Fuckel symb. myc. Nachtrag I p. 326, II p. 47. (? Karsten myc. fenn. I p. 242. Jod —; *Michelia* VII p. 333 sporidia utrinque acutiuscula!)

exs: Rabh. f. eur. 457. hb. myc. II 519. Fuckel f. rhen. 2368, 2669. Thümen myc. un. 276 a, 277 b. Kunze f. sel. 171, 366. Spegazzini dec. myc. it. 103. Rehm Ascomyc. 265, 514 (non = Phillips elv. brit. 148).

Asci ovato-clavati, c. 120/15, 8 spori. Sporidia obtusa, elliptica, 1 cellularia, hyalina, —27/—10, disticha. Paraphyses filiformes, granulatae, superne 2 mikr. crassae Epitheciumque flavum formantes, clava elliptica flavidula. Hypothecium flavum. Jodii ope apex ascorum violascit.

Ad ramulos siccos *Cytisi austriaci* prope Szent-Miklós in insula Csepel Danubii (Pest) 6/1873 Lojka sub 1994.

47. ***Calloria coccinella*** (Sommf. sub *Peziza*) Rehm.

syn: *Orbilium* — Karsten myc. fenn. I p. 98.

cfr Nyl. pez. fenn. p. 55. Saccardo f. Ven. nov. IV p. 30. *Michelia* I p. 428.

exs: Rehm Ascomyc. 71 (sub *C. coccinella* f. *vinosella* Nyl.) Exemplar juvenile! Asci clavati, 30/3—4. Sporidia, ut videtur, subglobosa, hyalina, monosticha. Paraphyses filiformes, clava rotunda coronatae. Hypothecium flavidulum. Jod —.

Ad lignum putridum in Galicia australi. 1869 Lojka sub 20.

48. ***Calloria fusarioides*** (Berk. sub *Peziza*) Fr. S. Veg.; Tul.

cfr. Nyl. pez. fenn. p. 57. Cooke hdb. p. 704. Karsten myc. fenn. I p. 96 (? Fuckel symb. myc. p. 282).

exs: Rehm Ascomyc. 72. Spegazzini dec. myc. it. 26. Thümen myc. un. 277. Karsten f. fenn. 646. Zopf et Syd. myc. march. 90. Sacc. myc. Ven. 1501. Rabh. hb. myc. II 676. (? 20, 73; Cooke f. brit. II 381.) Moug. et Nestler stirp. vog. 396 (*Dacrymyces*) sub *Tremella Urticae* Pers.

Asci clavati, 8 spori, 50—55/10. Sporidia disticha, elongato-ovata, 1 (—2) cellularia, recta vel subcurvata, hyalina, 9—10/4; Paraphyses parcae, filiformes, superne subincrassatae. Jod —.

Ad caules siccas *Urticae dioicae* in horto Esterházyano Kaposvár (Somogy). 5/1871 Lojka.

Edita in Rehm Ascomyc. 72!

49. ***Calloria vinosa*** (Alb. et Schw. sub *Peziza*) Fr.

syn: *Orbilium* — Karsten myc. fenn. I p. 101. (? *Habrostictis rubra* Fuckel symb. myc. p. 249 Nachtrag II p. 47).

cfr Nyl. pez. fenn. p. 56. Saccardo f. Ven. nov. IV p. 30. *Michelia* I p. 63. Cooke hdb. p. 700. Dr. Winter in Flora 1872 p. 510. (non Fuckel symb. myc. p. 283 (sec. descriptionem paraphysum pertinet ad *C. coccionellam*).

exs: Rehm Ascomyc. 17. Fuckel f. rhen. 2554 (sub *Habr. rubra*). Rabh. f. eur. 1412. (non Fuckel f. rhen. 2569 = *Peziza luteorubella* Nyl. pez. fenn. p. 55, nec Ellis n. am f. 142 = *Calloria occulta* Rehm).

Hymenium rubidulum; Paraphyses filiformes, in clavam sensim abeuntes; asci clavati c. 30/6. Sporidia desunt.

Exemp'aria haud evoluta huc trahenda videntur.

Ad ramulos siccos Rosae caninae in valle Koleczvárensi (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1873 Lojka.

50. ***Calloria vinosula*** Rehm nov. spec. 1872!

Perithecia vix conspicua, minutissima, gregaria, sessilia, humida subconvexa, sicca concavula, flavidula, parenchymatice contexta. Asci ovato-elliptici, apice incrassati, 8 spori, 30/6—8. Sporidia disticha, elliptica, obtusa, 1 cellularia cum nucleis 2—4, dein 1 septata, hyalina, 6—8/2. Paraphyses superne trifidae, articulatae, in clavam ellipticam, hyalinam, — 3 mikr. crassam apice ampliatae ascosque superantes. Jod —. Kaposvár (Somogy) leg. Lojka.

a. ad ramum decorticatam Sambuci Ebuli.

b. ad caulem siccam Daturae Stramonii sub 117b.

51. ***Durella atrata*** (Hedw. sub Lichen) Rehm.

syn: *Peziza* — Wahlbg. *Patellaria* — Fr. syst. *Lecanidion* — Rabh. *Peziza patellaria* Pers. *Lecidea saphrophila* Fw. *Ucographa Lecanactis* Mass. catagr. p. 4. *Opegrapha* Mass. symm. p. 64. *Pragmopora*—Körb. par. lich. p. 279.

cfr Nyl. pez. fenn. p. 67. Saccardo myc. Ven. p. 161. tab. XV f. 47. Fuckel symb. myc. p. 266 tab. IV f. 32 (non Cooke hdb p. 716).

exs: Körber lich. sel. germ. 199. Anzi lich. rar. Ven. 96. Rabh. f. eur. 1612. Zwackh lich. 444. Saccardo myc. Ven. 263. Fuckel f. rhen 1118. Ellis n. am. f. 64. Erb. critt. it. 821. Rehm Ascomyc. 574 (? Phillips elv. brit. 90), — non Cooke f. brit. II 194 (sporidia 4—5 cellularia, 21—30/4—4,5 Jod) = *Durella atrella* Rehm nov. spec.

Asci clavati, apice incrassati, c. 120/18, 8 spori, Sporidia elongato-clavata, obtusa, recta vel plerumque subcurvata, 6—8 cellularia, unaquaque cellula nucleo uno magno praedita, hyalina,

— 459, disticha. Paraphyses filiformes, superne ramosae et in clavam ellipticam, — 5 mikr. crassam, coeruleam exeuntes. Hypothecium nigrocoeruleum. Jod —

Ad caules *Maydis* putrescentes. Kaposvár (Somogy) 1872 Lojka sub 113.

52. **Durella commutata** Fuckel symb. myc. p. 281.

exs: Rabh. hb. myc. II 509 (sub *Peziza compressa*).

Asci clavati, 8 spori, 45/6; Sporidia ovata, 1 cellularia, hyalina, superne disticha, 6—8/—3. Paraphyses filiformes, apice clava crassa fusca instructae. Jod —

Ad lignum decorticatum. Kaposvár (Somogy) 1872 Lojka sub 61.

53. **Durella lecideola** (Fr. S. V. Sc. sub *Patellaria*) Rehm.

syn: *Peziza* — Fr. obs.

cfr Karsten myc. fenn. I p. 234. Nyl. pez. fenn. p. 64 (Jod +).

Asci clavati, crassi, 8 spori, c. 66/15; Sporidia obtusa, elliptica, 4 cellularia, hyalina, demum fuscidula, 15—18/7—8, disticha. Paraphyses septatae, clava fuscidula, 4—5 mikr. crassa praeditae. Jod —

Ad lignum decorticatum. Kaposvár (Somogy) 1872 Lojka sub 152.

Dubium mihi est, an exemplar hungaricum ad speciem designatam pertineat. Exemplar originale hujus speciei mihi plane ignotum hucusque et reactio jodina minime congruit.

54. **Karschia Strickeri** Körb. par lich. p. 460.

syn: *Patellaria* — Saccardo in *Michelia* I p. 57. *Poetschia* — Stein schlesische crypt. flora II 2 p. 224. (? *Arthonia melaspormella* Nyl. *Patellaria lignyota* Fr.)

cfr *Grevillea* VI p. 25. *Flora* 1872 p. 511, 1874 fragm. *Arnoldii* 16, Saccardo f. *Ven. nov.* IV p. 29.

exs. Rehm *Ascomyc.* 21 (sub *K. nigricans*). Saccardo myc. *Ven.* 1201. Phillips *elv. brit.* 146 et Ellis n. am. f. 400 (sub *Patellaria lignyota*).

Asci clavati, apice incrassati, 8 spori, 30—36/12. Sporidia ovata, 2 cellularia, cellulis anisomeris, fuscidulis, disticha, 9—11/4, Paraphyses conglutinatae. Hypo- et Epithecium fuscidulum, Hymenium viridiflavum. Jodii ope asci coerulescunt.

Ad ramum querneum putridum in sylva Holobutowensi prope *Brigidau* (Sambor) Galiciae australis. Lojka. 8/1869.

55. **Melaspilea Peltigerae** Nyl. pez. fenn. p. 65 adn.

syn: *Pseudopeziza* — Fuckel symb. myc. p. 291.

cfr Arnold in *Flora* fragm. 16.

exs: Fuckel f. rhen. 1871. Rehm Ascomyc. 19. Arnold lich. exs. 700. Thümen myc. un. 1707.

Asci clavati, 8 spori, — 75/18; Sporidia elongato-ovoidea vel subfusiformia, 2—4 cellularia, hyalina, disticha, 18—24,5—7. Paraphyses filiformes, superne clavatae et Epithecium viride formantes. Hypothecium flavescens. Jod —

Ad thallum vivum Peltigerae horizontalis L. prope Eperjes. Lojka 10/1869.

56. **Cryptomyces Peltigerae** Fuckel symb. myc. p. 253.

exs: Fuckel f. rhen. 2069.

Exemplaria Hymenio prorsus involuto!

Ad saxa micaceo-schistosa vallis Kolcvárensensis prope rivulum „Riu sor“ infra alpem Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1873 Lojka sub 2262—3.

57. **Dermatea fascicularis** (Alb. et Schw. sub Peziza) Fr.

syn: Peziza populnea Pers. Encoelia fascicularis Karsten.

cfr Karsten myc. fenn. II p. 217. Fuckel symb. myc. p. 278. Cooke hdb. p. 678. Nyl. pez. fenn. p. 15.

exs: Rabh. hb. myc. II 620 (? f. eur. 721), Fuckel f. rhen. 1128; Cooke f. brit. I 478. Phillips elv. brit. 17a, b. Thümen myc. un. 663. Rehm Ascomyc. 301.

Asci clavati, apice subincrassati, 75/7—8, 8 spori. Sporidia oblonga, obtusa, recta vel subcurvata, hyalina, 1 cellularia, disticha, 12—15/3—3,5. Paraphyses filiformes, apice sensim clavatae et fuscidulae. Epi- et Hypothecium viridi-fuscum. Jod —

a. ad corticem emortui Fraxini Orni in valle Kolczárensi. (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1873 Lojka.

b. ? ad lignum putridum in valle „Riu sor“ infra alpem Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae. 9/1874 Lojka sub 3450.

Exemplaria prorsus involuta et dubia, ascis et sporidiis plane deficientibus! Perithecia purpureo tincta.

58. **Dermatea Syringae** Rehm nov. spec. 1873.

Perithecia plerumque gregaria, ex rimis epidermidis erumpentia, primitus globosa, dein irregulariter expansa, rugoso-marginata, fusca, 0,5—1,5 mm. diam. Asci clavati, 8 spori, 50—60/5. Sporidia elliptica vel oblongato-ovoidea, 1 cellularia, saepe 2 nucleata, hyalina, disticha, 8—9,2—2,5. Paraphyses filiformes, superne clava fusca 4—5 mikr. crassa instructae Jod —

Ad ramum siccum Syringae vulgaris prope Plavisevicza com. Szörény in Hungaria 9, 1872 Lojka sub 1001 B.

59. **Cenangium Cerasi** (Pers. sub Peziza —) Fr. syst.

syn: Dermatea — De N.; Tul.

cfr Karsten myc. fenn. II p. 223 (J—!) Fuckel symb. myc. p. 267. Cooke hdb. p. 724. Saccardo myc. Ven. p. 160.

exs: Mougeot et Nestler stirp. Vog. 494. Rabh. hb. myc. II 517, f. eur. 1025. Badische crypt. 435. Fuckel f. rhen. 1127. Cooke f. brit. II 659 (J !) Thümen myc. un. 1863. Phillips elv. brit. 193 Rehm Ascomyc. 421.

Asci clavati, 90/9—10, 6—8 spori. Sporidia oblonga vel elliptica, obtusa, recta vel subcurvata, 1 cellularia, plerumque nucleo 1 magno centrali instructa, hyalina, disticha, 15/4. Paraphyses filiformes in clavam c. 3 mikr. crassam, fuscam ampliatae. Hymenium et Hypothecium flavidulum. Jodii ope apex ascorum coeruleescit.

Ad ramum siccum Cerasi. Kaposvár 1872 Lojka sub 133.

60. **Cenangium Prunastri** Fr. syst. V.

syn: Dermatea — Fr. S. V. Sc.

cfr Fuckel symb. myc. p. 267. Cooke hdb. p. 724.

exs: Rehm Ascomyc. 213 (? Fuckel f. rhen. 1126), non Rabh. f. eur. 125.

Asci clavati, 8 spori, 60—70/12. Sporidia oblonga vel elongato-ovata, obtusa, 1 cellularia, 1—2 nucleis magnis praedita, an demum 2 cellularia?, hyalina, disticha, 12—14/4. Paraphyses filiformes, superne furcatae. Epi- et Hypothecium viridulum, Hypothecium fuscum. Jod —

Ad ramos siccos Pruni domesticae prope Malomviz (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1873 Lojka.

Edita in Rehm Ascomyc. 213!

61. **Tympanis amphiboloides** Nyl. var. hypopodiza. Nyl.

cfr Nyl. pez. fenn. p. 71. adn. p. 72. Karsten myc. fenn. II p. 231.

exs: ? Rehm Ascomyc. 358.

Asci clavati, crassi, — 100/10—15, 8 spori. Sporidia elliptica, subacutata, 4—8 cellularia, cellula media plerumque longitudinaliter semel divisa, hyalina, 18—24/3, disticha. Praeterea repleti sunt asci granulis minimis. Paraphyses ramosae, articulatae, clava 5—6 mikr. crassa, fuscidula praeditae. Epi- et Hypothecium viride. Jod —

a. ad ligna quercina prope Kaposvár (Somogy) 1872 Lojka sub 55.

b. ad ligna pinea in Transsylvania. Lojka sub 2521.

62. **Tympanis Pinastri** Tul. carp.

(? = Fuckel symb. myc. p. 269.)

syn: *Cenangium laricinum* Fuckel symb. myc. p. 270.

cfr Nyl. pez. fenn. p. 73.

? Karsten myc. fenn. I p. 28 (nil dicit de ascis polysporis).

exs: Fuckel f. rhen. 2473 (sub *C. laricinum*), (? 1103 sub *Triblidium*). Phillips elv. brit. 145. Rabh. f. eur. 33 sub *Lecanidion atrum*); explr in Fuckel symb. myc. p. 266 = *Triblidium pithyum declaratum*!. Rehm Ascomyc. 356. (? Rabh. 1231, Erb. critt. it. II 828, Moug. et Nestl. stirp. Vog. 587 p. p.).

Asci clavati, apice incrassati, 90/9, myriaspori; Sporidia oblonga, hyalina, 2-2,5/1. Paraphyses filiformes, apice subcurvatae, articulatae et clava fuscidula — 5 mikr. crassa instructae. Epi- et Hypothecium fuscum. Jod —

a. Ad abietum corticem prope Teplicska (Liptó) 8/1872 Lojka sub 1359, ibidemque Zatracsano infra alpem Dzurowa.

b. Ad ramulos pineos in Galicia australi 1869 Lojka.

63. **Heterosphaeria Patella** (Tode sub *Sphaeria penetrans* α patella) Grev.

syn: *Sphaeria* — Pers. *Peziza fimbriata* Chaill. *Peziza Chailletii* Pers. *Peziza leucomela* β *Umbelliferae* DC. *Peziza Ligustici* DC. *Phacidium Patella* Fr. *Tympanis* — Wallr.

cfr Fuckel symb. myc. p. 266. Karten myc. fenn. I p. 222 (asci apice Jod —!) Saccardo myc. Ven. 160, *Michelia* I p. 262, 332. (? Cooke hdb. p. 754 propter sporidia 1-4 septata).

var. *Lojkae* Rehm 1871!

syn: *Pyrenopeziza fuscoatra* Hazslinszky Kőzlemen. 1873. p. 58. tab. II f. 10; Zool. bot. Vhdlgen 1873 p. 368.

cfr Winter in Flora 1872 p. 510.

exs: Rehm Ascomyc. 15 a, b, 209 (sub *Pyrenopeziza* —).

Perithecia parenchymatica, fusca disco pallido vel roseo. Asci clavati, 8 spori, 60/9-12. Sporidia oblonga, obtusa, recta, interdum subcurvata et intus granulata, 1 cellularia, hyalina, disticha, 12-15 4-5. Paraphyses filiformes, in clavam ellipticam, c. 2,5 mikr crassam, hyalinam exeuntes ascosque superantes. Jodii ope apex ascorum coeruleescit.

a. Ad caules siccas *Umbelliferarum* prope lacum Zenoga infra alpem Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae c. 6000' alt. 8/1872 Lojka.

b. Ibidem prope Soborsin in Hungaria 7/1872 Lojka.

Differt sporidiis plerumque 2 cellularibus. Jod —

Edita ex loco a in Rehm Assomyc. 209!

64. **Lachnella corticalis** (Pers. sub Peziza) Fr. S. Veg. Sc. syn. Helotium—Karsten myc fenn I p. 159.

cfr Nyl. pez. fenn. p 27 f. 3, Fuckel symb. myc. p. 280.

Saccardo myc. Ven. p. 161. Michelia I p. 472. Cooke hdb. p. 687.

exs: Fuckel f. rhen. 1120. Rabh. hb. myc. II 625. f. eur.

915. Thümen myc. un. 280. Phillips elv. brit. 119. Kunze f. sel. 562.

Perithecia prosenchymatice contexta, pilis simplicibus, septatis, glabris, fuscis, c. 3 mikr. crassis obsessa. Asci clavati, apice incrassati, c. 75/6, 8 spori. Sporidia elliptica, subacuta, recta, hyalina, 2 cellularia, disticha, 12—15/3. Paraphyses filiformes. Jodii ope apex ascorum coerulescit.

In sylva Stryhaniecensi prope Gelsendorf (Stryj) in Galicia australi ad truncum Populi putrescentem. 8/1869 Lojka sub 329.

65. **Lachnella flammea** (Alb. et Schw. sub Peziza) Fr.

syn: Helotium—Karsten myc. fenn. I p. 157.

cfr Fuckel symb. myc. p. 280. Nyl. pez. fenn. p. 28.

exs: Fuckel f. rhen. 1121. Rabh. hb. myc. II 22. Phillips elv. brit. 72. Thümen myc. un. 520. Rehm Ascomyc. 418.

Perithecia prosenchymatice contexta, pilis simplicibus, fuscis, obtusis, subglabris c. 4—5 mikr. crass. obsessa. Asci clavati 75—80/9—10, 8 spori. Sporidia oblonga, obtusa, recta vel subcurvata, 1 cellularia, hyalina, —24/4, disticha. Paraphyses filiformes, apice haud clavatae. Jod —

Ad ramum decorticatum Lonicerae? Kaposvár. (Somogy) 1871 Lojka sub 484.

66. **Tribliodopsis Pinastri** (Pers. sub Peziza) Karsten myc. fenn. I p. 262.

syn: Cenangium — Fr. syst. Phacidium — Fr. elench. Triblidium — Fr. S. V. Sc.

cfr Nyl. pez. fenn. p. 73. (non = Fuckel symb. myc. p. 269 tab. IV f. 28)

exs. Karsten f. fenn. 557 (? Rabh. f. eur. 1026, 1103 sub Triblidium, 1140 sub Tympanis).

Exemplaria plane involuta sine ascis et sporidiis!

Ad ramulos pineos. „Válye Rásza“ (Retyezát) in Transsylvania. Lojka sub 1723.

67 **Phacidium Maydis** Rehm nov. spec. 1873.

Perithecia gregaria, hemisphaerica, epidermide denigrata pustulatumque elevata immersa, dein in lacinias 4—6 triangulares dilacerata et discum pallidum, orbicularem, planum aperientia, pa-

renchymatice viridi-fusce contexta, c. 0,8—1 mm. diam. Asci clavati, 8 spori, 60/7—8. Sporidia filiformia, ut videtur 8 cellularia et in-cellulas singulas haud difficiliter soluta, hyalina, parallele contorta, 30—36/1,5. Paraphyses filiformes, c. 2 mikr. crassae. Jod —

Ad caulem putridam Zeae Maydis. Kaposvár (Somogy) 1872. Lojka sub 112.

68. **Aggrium rufum** (Pers. sub Stictis) Fr.

cfr Cooke hdb. p. 733. Nyl. lich. scand. p. 250. Minks in Flora 1880 no 33.

exs: Anzi lich. it min. rar. 466. Phillips elv. brit. 142. Ravenel n. am. f. 314. Ellis f. n. am. 450.

Sporidia ovata, nucleo 1 magno centrali praedita, 1 cellularia, hyalina, 12/6—7, 8 disticha in ascis clavatis. Hypothecium hyalinum. Paraphyses superne fuscidule conglutinatae. Jodii ope Hymenium coeruleescit.

Ad ligna pinea decorticata circa lacum Zenoga infra alpem Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae. Lojka sub 2409.

69. **Coccomyces quadratus** (Schmitt et Kunze sub Phacidium) Karsten.

syn: Phacidium leptideum Fr. syst.

cfr Karsten myc. fenn. I p. 255. Fuckel symb. myc. p. 262.

exs: Moug. et Nestl. stirp. vog. 984. (? Fuckel f. rhen. 1092. Thümen f. austr. 873).

Asci — 105/15, 8 spori Sporidia filiformia, pluricellularia, hyalina, c. 65 2,5, parallela. Paraphyses filiformes. Jod —

Ad frutices Vaccinii Myrtilli prope Teplieska (Liptó) 8/1872 Lojka sub 1204.

70. **Pleiostrictis propolidoides** Rehm nov. genus et spec. 1880!

Perithecia in ligni dealbati superficie primitus immersa, lire-laeformiter supremo ligni strato cincta, dein fere sessilia, primitus elliptica, dein rotundata, subplana, aperta, margine tenui, sublacerato, concolori cincta, atrofusca. gregaria, c. 0,8 mm. diam.

Asci elongati, monospori. Sporidia oblonga, obtusa, hyalina, dein fuscidula, transverse 12—16, longitudinaliter 1·2 septata, 24—30/5—9. Paraphyses filiformes, superne c. 3 mikr. crassae, clavatae, fuscidulae, conglutinatae. Hymenium alt. c. 45 mikr. Hypothecium dilute fuscidulum. Jodii ope Hymenium coeruleescit, dein vinose rubescit.

Ad ramulos Abietum in regione „Arágyes“ infra alpem Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae 8/1873. Lojka sub 2430.

Genus *Stictideum* valde eximium ascis monosporis, sporidiis oblongis, multicellularibus.

Etab cl. Arnoldio allatum speciminulum ex alpbibus editioribus prope Kùhteil (Oetz) ad lignum decorticatum Pini Cembrae in herbario meo depositum est!

71. **Robergea unica** Desm. 1847.

syn: ? *Cryptella* - Quell. *Tuberculostoma lageniforme* Sollm.

Valsa—Currey. *Ostropa cubicularis* Fuckel. (non *Sphaeria* — Fr.).

cfr Cooke hdb. p. 829. Fuckel symb. myc. p. 92. Hedwigia 1868 no 3 adn. *Michelia* I p. 252, 257.

exs. Rabhorst f. eur. 765 (sub. *Tub. lageniforme*), Fuckel f. rhen. 2035 (*Ostropa cubicularis*), Thümen f. austr. 1156 (*Schmitzomyia radiata*), Rehm *Ascomyc.* 31 sub *Ostropa cubicularis*.

Asci cylindracei, apice valde incrassati, 8 spori. Sporidia filiformia, multicellularia, hyalina, c. 200/2,5, parallela. Paraphyses filiformes, tenerrimae Jod —

Ad ramulos *Syringae vulgaris* (ibidem spontaneae) prope Cetati Boli (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1873 Lojka sub 2094.

72. **Colpoma quercinum** (Pers. sub *Hysterium*) Wallr.

syn: *Cenangium* — Fr. *Clithris*— Karsten myc. fenn. I p. 221.

cfr Fuckel symb. myc. p. 257. Cooke hdb. p. 765. Saccardo myc. Ven. p. 157.

exs: Moug. et Nestler stirp. vog. 367. Rabh. hb. myc. II 449. *Badische crypt.* 645. Fuckel f. rhen. 760. Cooke f. brit. II 197. Thümen myc. un. 369 (? f. austr. 508). Saccardo myc. Ven. 717, 259. Karsten f. fenn. 328 (sub *Cenangium*). Rehm *Ascomyc.* 27.

Asci elliptici, stipitati, — 135/9, 8 spori. Sporidia filiformia, multicellularia, hyalina, parallela, extus ascos convoluta, c. 90/1,5. Paraphyses filiformes, tenerrimae, superne hamulatae. Jod —

Ad ramulos querneos siccos, Kaposvár 1871 Lojka sub 148.

73. **Lophium mytilinum** Pers. (sub *Hysterium* —) Fr.

syn: ? *Lophidium mytilinellum* Karsten myc. fenn. II p. 247.

cfr Fuckel symb. myc. p. 83. Cooke hdb. p. 766. Saccardo f. Ven. IV p. 28. (non Karsten myc. fenn. II p. 245) *Mytilinidion aggregatum*); *Revue myc.* 11 p. 49.

exs: Rabh. hb. myc. II 714. Fuckel f. rhen. 762.

Asci cylindracei, 8 spori. Sporidia filiformia, multicellularia, hyalina, parallela, c. 100/2. Paraphyses filiformes, tenerrimae. Jod —

Ad ramulos pineos siccos in Galicia australi 8/1869. Lojka sub V 1869.

74. **Mytilinidion lineare** Rehm nov. spec.

exs: Rehm Ascomyc. 216.

Perithecia sessilia, in maculas atras, subrotundas, c. 1—3 mm diam. coacervata, minutissima, mytiliformia, atra, carbonacea, sublinearia. Asci cylindraceo-clavati, apice incrassati, 8 spori, 60/6 Sporidia elongato-fusoidea, recta vel subcurvata, didyma, fuscidula, disticha, 12/2,5. Paraphyses ramosae. Jod —

Ad frustula ligni pinei putrescentis in valle Zserelen infra montem Domuglad prope Thermas Herculis com. Szörény in Hung. 4/1874 Lojka sub 2586.

Edita in Rehm Ascomyc. 75.

75. **Mytilinidion tortile** (Schwein. syn. p. 50 sub Hysterium).
cfr Saccardo f. Ven. IV p. 27.

exs: Thümen myc. un. 74. Rehm. Ascomyc. 269 [non Saccardo myc. Ven. 1174 (sporidia dimidio minora!)]

Sporidia oblonga, obtusa, 6 cellularia, plus minusve nucleata, ad septa vix constricta, recta, fusca, 24/9; 81½ sticha in ascis cylindraceo-clavatis, crassis c 140/15. Paraphyses paucae, superne ramosae. Jod —

Ad corticem trunci Juniperi Sabinae; Petrila (Hunyad) in Transsylvania. 1873 Lojka sub 2126.

Species hucusque tantum ex America septentr. cognita!

76 **Lophodermium arundinaceum** (Schrad. sub Hysterium) Chev. syn: Hysterium culmigenum Fr., H. apiculatum Fr., gramineum Moug., H. seriatum Lib., caricinum Rob., Lophodermium Actinothyrium Fuckel symb. myc. Nachtrag III p. 28.

cfr Fuckel symb. myc. p. 257. Cooke hdb. p. 763. Karsten myc. fen. II p. 242. Saccardo myc. Ven. p. 157. Michelia I. p. 252.

exs: Fuckel f. rheu. 737, 738, 739, 740, 741, 1751, 2557, 2675. Cooke f. brit. II 300. Rabh. hb. myc. II 444. a, b, 723. f. eur. 1226 (? 1613). Thümen myc. un. 77, 471, 661. Saccardo myc. Ven. 1173. 1280. Moug. et Nestler stirp. vog. 655. (? 368). Kunze f. sel. 160, 161, 372. Zopf et Sydow myc. march. 25. Ellis n. am. f. 465. Rehm Ascomyceten 271 (sub f. culmigenum), 580 (f. Secalis).

Asci clavati, apice conico-truncati, 75/9—10. 8 spori. Sporidia filiformia, nucleata, subrecta, hyalina, 1 cellularia, 8 parallela sita. Paraphyses apice subincrassatae, vix hamulatae. Jod —

Ad folium gramineum prope Tököl in insula Danubii Csepel (Pest.) 1873 Lojka sub 1988.

77. **Hysterium acuminatum** Fr. syst.

cfr Fuckel symb. myc. p. 259. Rabh. D. Crypt. I. p. 154.

f. **alpinum** Rehm.

exs: ? Fuckel f. rhen. 750. Rehm Ascomyc. 125 sec. Minks.

Asci cylindracei, 8 spori. Sporidia oblonga, 4 cellularia, medio, minus ad cetera septa subconstricta, interdum una cellularum mediarum longitudinaliter septata, recta, fusca, 15—18/6—7, monosticha Paraphyses ramosae. Jod —

Ad truncum putridum Pini circa lacum Zenoga infra alpem Rétyezát (Hunyad) Transsylvaniae. Lojka sub 2407.

Mihi plane dubium est, an haec species certe sit *Hysterium acuminatum* Fr. Exemplar Fuckelii cum meis in Ascomyc. 125 ex Alpibus editoribus Tyrolensibus editis haud congruit.

78. **Hypoderma virgultorum** DC. fl. fr. 5 p. 165; Duby hyst. 41.

cfr Fuckel symb. myc. p. 258. Cooke hdb p. 761. Saccardo myc. Ven. p. 158. Michelia I p. 57, 514.

f. **Rubi**.

exs: Moug. et Nestl. stirp. vog. 564 (sub *Hysterium Rubi*).

Rabh. hb. myc. II 443, f. eur. 1618. Fuckel f. rhen. 757. Cooke f. brit. II 460. Thumen myc. un. 180. Saccardo myc. Ven. 720. Kunze f. sel. 162. Rehm Ascomyc. 362.

Asci superne elliptici, longe stipitati, 8 spori; Sporidia elliptica vel fusiformia, subobtusa, recta vel subcurvata, primitus 1 cellularia cum nucleis 2 magnis, dein 2 cellularia, hyalina, 2—3 sticha. Paraphyses filiformes, apice hamulatae. Jod —

Ad ramulos siccos Rubi Idaei infra „Theu ursului“ prope Lunkány in Hungaria. 7/1872. Lojka sub 1883a.

79. **Glonium lineare** (Fr. sub *Hysterium*) De N.

cfr Fuckel symb. myc. p. 260. Cooke hdb. p. 760. Saccardo myc. Ven. p. 159 tab. XVI f. 13—15. Karsten myc. fenn II p. 237. Revue myc. 11 p. 237.

exs: Rabh. f. eur. 841. Fuckel f. rhen. 754 (sub *Gl. confluens*), 2560. Cooke f. brit. II 457. Saccardo myc. Ven. 948 (sub *Gl. lineare* var. *angustissimum* De N.). Rehm Ascomyc. 365. Ellis n. am. f. 463.

Exemplar nimis vetustum cum singulis sporis.

Ad lignum decorticatum Coryli (?). Kaposvár (Somogy). 1872. Lojka sub 43.

80. **Pseudographis Carestiae** (De N. sub *Blitridium*) Rehm.

cfr De N. in erb. critt. it. II 92. Hedwigia 1868 p. 121.

s y n : Phacidiopsis alpina Hazsl. in bot. Vhdlgen 1873 (non = Peziza macrospora Karsten, Nyl. cfr Karsten myc. fenn. I. p. 235. Nyl. pez. fenn. p. 66, quae = Patellaria Carestiae declaratur !)

e x s : Rabh. f. eur. 1224 (sub Blitridium).

Perithecia senilia, ascis subevanidis. Sporidia obtusa, oblonga, 8 cellularia, hyalina, 18/9. Paraphyses filiformes, guttulatae, rigidae. Hypothecium flavidulum. Jod —.

Ad ramulos siccos, pendulos Rhododendri myrtifolii. Retyezát in Transsylvania 1872; leg. Lojka sub 1849.

81. **Pseudographis pinicola** (Rebent. sub Peziza) Rehm.

s y n : Heterosphäria — Fr. S. V. Sc. Triblidium—Cooke in Grevillea IV tab. 67 f. 8. (non Crumenula pinicola Karsten myc. fenn. I p. 210.)

c f r Nyl. pez. fenn. p. 5, 77 adn.

e x s : Rabh. f. eur. 124. Schweiz. crypt. 627 (sub Hysterium elatinum). Rehm Ascomyc. 24 (sub Hysterium piniculum).

Asci clavati, 150/15, 8 spori. Sporidia elliptica, subobtusa, recta vel navicularia, (2) plerumque 8 (rarius 10) cellularia, hyalina, 30/9, disticha. Jodii ope episporium valde coerulescit.

Ad corticem Pinorum vallis „Riu sor“ infra alpem Retyezát in Transsylv. Lojka sub 1864.

82. **Xylographa parallela** (Ach. sub Opegrapha —) Fr. S. V. Sc.

s y n : Hysterium — Wahlbg. Stictis — Sommf., Fr. syst.

c f r Th. Fries lich. arct. p. 242. lich. scand. p. 638 Krenpelhuber Bay. Lich. p. 266. Nyl. lich. scand. p. 250. Koerb. par. lich. 275. Cooke hdb. p. 736. Fuckel symb. myc. p. 252. Stein schles. Flechtenflora p. 261. Saccardo f. Ven. V p. 184. Minks in Flora 1880 no 34.

e x s : Koerb. lich. sel. germ. 257. Anzi lich. Lang. 346. Arnold lich. exs. 244 a, b. Fuckel f. rhen. 2672. Kunze f. sel. 368. Rehm Ascomyc. 124.

Asci clavati, 8 spori, 60—70/18; Sporidia plus minusve ovata vel elliptica, 1 cellularia, nucleo 1 magno centrali, rarius nucleis 2 praedita, hyalina, 12—15/6, disticha. Paraphyses filiformes, articulatae et in clavam fuscam c. 5 mikr. diam. exeuntes. Hypothecium hyalinum, Epithecium fuscum. Jodii ope Hymenium coerulescit.

a) Ad asseres regionis Tielhavy prope Teplicska (Liptó). 8/1872 Lojka sub 1242.

b) ad lignum decorticatum Pini Pumilionis. Válye Rásza infra alpem Retyezát Transsylvaniae. 8/1872 Lojka sub 1728.

83. **Xylographa spilomatica** (Anzi symb. p. 20 sub Agyrium) Th. Fr. lich. scand p. 639.

syn: X. minutula Körb. par. lich. p. 276. X. corruscans Norm. bot. not. 1872. p. 34.

cfr Stein schles. Flechtenflora p. 261. Minks in Flora 1880 no 34.

exs: Anzi lich. lang. no 385 (sub Agyrium rufum). Arnold lich. exs. 563 et Rehm Ascomyc. 123 (sub X. minutula).

Asci clavati, apice incrassati, 8 spori, c. 66/15. Sporidia suovata vel oblonga, obtusa, nucleo 1 magno centrali praedita, 1 cellularia, hyalina, 9 - 12/5, disticha. Paraphyses filiformes, superne crassiores et fuscidulae, conglutinatae. Hypothecium hyalinum. Jodii ope Hymenium coerulescit.

Ad truncum abietinum putridum in valle „Riusor“ infra alpem Retyezát Transsylvaniae. 8/1872 Lojka sub 1874.

84. **Helvella albipes** Fuckel symb. myc. p. 334. t. 5 f. 2.

cfr Cooke mycogr. p. 198 tab. 93 f. 336.

exs: Fuckel f. rhen. 1240 (f. minor.)

Exemplar altitudinis 7 cm! Asci cylindracei, 4 spori. Sporidia oblonga, obtusa, nucleo magno 1 centrali instructa, 1 cellularia, glabra, monosticha, 18/12. Paraphyses filiformes, superne articulatæ et c. 4 mikr. diam. clavatae. Jod —

Ad terram arenosam sub Populo. Szent-Miklós in insula Danubii Csepel (Pest). Lojka 6/1873 sub 1997.

85. **Ascophanus carneus** (Pers. syn. p. 676 sub Ascobolus) Boudier mem. p. 60 pl. 12 f. 48—49.

syn: Peziza — Karsten myc. fenn. I p. 60. Ascobolus — Cooke hdb. p. 60. Ascophanus saccharinus Boud. mem. p. 6.

cfr Nyl. pez. fenn. p. 86. Fuckel symb. myc. p. 288. Michelia I p. 70, 236, II p. 77.

exs: Fuckel f. rhen. 1857. Rabh. f. eur. 625 (sub Peziza testacea), 1449. Thümen f. austr. 1012. Cooke f. brit. II 398. Ravenel f. amer. 176. Phillips elv. brit. 197. Rehm Ascomyc. 2 (? 425, videtur Peziza difformis Karsten myc. fenn. I p. 61, Nyl. pez. fenn. p. 85, syn? Ascobolus saccharinus Berk., Cooke hdb. p. 731.)

Asci clavati, 8 spori, 100/21 - 24. Sporidia oblonga, obtusa, 1 cellularia, hyalina, — 18/10, disticha. Paraphyses filiformes, subhyalinae, apice sensim — 7 mikr. clavatae. Jodii ope Hymenium valde coerulescit.

a. Ad fimum vaccinum prope Gelsendorf (Stryj) Galiciae australis. 1869 Lojka.

b. ibidem Kaposvár (Somogy). 1871 Lojka sub 137.

c. ibidem. In ostio antri prope Ponor-Ohába (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1875 Lojka.

d. ibidem Transsylvania 1872 Lojka sub 1876 p. p.

e. ad laminas papyri putridas in horto Esterházyano Kaposvár (Somogy). 10/1871 Lojka sub 129.

86. **Ascophanus granuliformis** (Crouan sub Ascobolus) Boudier mem. p. 55.

syn: Peziza—Karsten myc. fenn. I p. 50.

cfr Cooke hdb. p. 729. Michelia II p. 235 (? Fuckel symb. myc. p. 288.)

exs: Rabh. f. eur. 782. Rehm Ascomyc. 104 (? Fuckel f. rhen. 1850, sporae majores!)

Asci clavati, 90/12, 8 spori. Sporidia ovata, obtusa, 1 cellularia, nucleo 1 centrali magno instructa, glabra, hyalina, 12—15/6—7, disticha. Paraphyses filiformes, apice subincrassatae, p. p. incurvatae. Jod —

Ad fimum vaccinum. Malomviz (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1872 Lojka sub 1879.

87. **Ascophanus pilosus** (Fr. sub Ascobolus) Boud. mem. p. 64.

syn: Peziza equina Müll., diversicolor Fr. syst., cervina Pers. Ascobolus papillatus Wallr., ciliatus Schmitt.

cfr Nyl. pez. fenn. p. 20, 86 adn. Karsten myc. fenn. I p. 72, 73. c. var. ciliata Schm. Cooke hdb. p. 731 (sub ciliatus).

exs: Rabh. hb. myc. II 426 (sub papillatus). Fuckel f. rhen. 1860 (subciliatus), 1133 (papillatus). Rabh. hb. myc. II 425 (ciliatus). Cooke f. brit. II no 190 et Phillips elv. brit. 97 (ciliatus). Kunze f. sel. 564. Rehm Ascomyceten 103 a, b.

Asci clavati, 8 spori, c. 100/30. Sporidia obtusa, elliptica vel oblonga, glabra, 1 cellularia, hyalina, 21/9, disticha. Paraphyses filiformes, haud clavatae. Pili perithecorum rigidi, acutati, simplices, non septati, glabri, hyalini, basi diam. 15—20 mikr. Jod —

Ad fimum vaccinum circa introitum antri prope Ponor-Ohába (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1875 Lojka.

88. **Saccobolus Kerverni** (Crouan sub Ascobolus) Boudier mem. p. 39 pl. VIII f. 18.

cfr Fuckel symb. myc. p. 287. Cooke hdb. p. 729. Michelia II p. 234.

syn: ? *Ascobolus glaber* Karsten myc. fenn. I. p. 78 (cfr Nyl. pez. fenn. p. 84.

exs: Fuckel f. rhen. 1846. Rabh. f. eur. 1313. Cooke f. brit. II 399 (delineatio non quadrat). Rehm Ascomyc. 166.

Asci ovato-clavati, 8 spori, c. 70/18. Sporidia obtusa, elliptica, 1 cellularia, fuscoviolacea, glabra, 21 - 24/9—12, in medio asci specificè conglobata; Paraphyses filiformes, articulatae, superne clavatae. Hymenium flavidulum. Jodii ope Hymenium coerulescit.

a. ad finum vaccinum prope Malomviz (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1872 Lojka.

b. ibidem Kaposvár in Hungaria. Lojka 1871 sub 176.

c. ibidem Bandrów in Galicia australi 1879 Lojka.

89. **Saccobolus violascens** Boud. mem. p. 40 tab. 8 f. 19.

syn: *Ascobolus glaber* Fuckel symb. myc. p. 287 (non Cooke hdb. p. 728 nec Nyl. pez. fenn. p. 83, exs. Rabh. f. eur. 778, nec = Karsten myc. fenn. I p. 78) ? *Ascobolus versicolor* Karsten myc. fenn. I p. 79.

exs: Fuckel f. rhen. 1134. Phillips elv. brit. 48 (videtur). Rehm Ascomyc. 165.

Asci ovato-clavati, 8 spori, c. 66/15. Sporidia elliptica, sub-obtusa, fusco-violacea, glabra, 1 cellularia, 15—17/7—8, in medio asci specificè conglobata. Paraphyses filiformes, superne clava c. 3 mikr. crassa, flavidula instructae, articulatae. Jodii ope Hymenium coerulescit.

Ad finum vaccinum. Singlér prope Eperjes. 10/1869 Lojka. (Exemplaria manca!)

90. **Saccobolus depauperatus** (Berk. et Br. sub *Ascobolus*).

syn: *Ascobolus Kerverni* Karsten myc. fenn. I p. 78.

cfr Cooke hdb. p. 729.

exs: Rabh. f. eur. 780.

Asci ovato-clavati, 8 spori, c. 40/18. Sporidia elliptica, demum fusca, 1 cellularia, glabra, 12/5, in medio asci specificè conglobata. Paraphyses conglutinatae, apice clavatae et flavidulae. Jodii ope Hymenium coerulescit.

Ad finum vaccinum prope Malomviz (Hunyad) Transsylvaniae. 1882 Lojka.

Speciminulum huc trahendum videtur!

91. **Ascobolus furfuraceus** Pers.

syn: *Peziza stercoraria* Bull P. fusca Huds.

cfr Nyl. pez. fenn. p. 83. Fuckel symb. myc. p. 286. Cooke

hdb. p. 727. Janczewski in Hofmann myc. Bericht III p. 94. Boudier mem. p. 29 pl. 6. Karsten myc. fenn. I p. 76. Michelia I p. 69, II p. 233, VII p. 258 (f. nudus Kickx).

exs: Fuckel f. rhen. 1132. Rehm Ascomyc. 1 *a, b*; Cooke f. brit. II 189. Phillips elvell. brit. 46. Ravenel f. am. 312.

Asci elliptico-clavati, 8 spori, c. 105/27. Sporidia elliptica, fuscoviolacea, episporio longitudinaliter, striaeformiter lacerato, 1 cellularia, — 24/10, disticha. Paraphyses filiformes, c. 2 mikr. crassae, superne vix clavatae. Epithecium flavidulum. Jod - . (interdum asci leviter coeruleseunt !)

a) Ad fimum vaccinum. Malomviz (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1872 Lojka sub 1878.

b) ibidem. Válye Rásza infra alpem Retyezát (Transsylvania). 8/1872 Lojka sub 1869.

c) ibidem prope Gelsendorf (Stryj) in Galicia australi 1869 Lojka.

d) ibidem circa introitum antri prope Ponor-Ohába. (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1875 Lojka (Exemplaria manca!).

92. *Ascobolus immersus* Pers.

syn: *Ascobolus macrosporus* Couan.

cfr Boudier mem. p. 37. Nyl. pez. fenn. p. 84. Cooke hdb. p. 728. Fuckel symb. myc. p. 286 (*immersus* et *macrosporus*). Karsten myc. fenn. I p. 79. Michelia I p. 234

exs: Fuckel f. rhen. 1847, 1848. Rehm Ascomyceten 102 *a, b*, (? Rabh. f. eur. 779). Cooke f. brit. II 397 sec. delin.

Asci ovales, 180/100, 8 spori. Sporidia elliptica, obtusa, demum violacea, episporio longitudinaliter, striaeformiter dilacerato, 1 cellularia, disticha, 48/30. Paraphyses filiformes, flavidulae, conglobatae. Jodii ope Hymenium coeruleseit.

Ad fimum vaccinum in Galicia australi. 1869. Lojka.

II. Pyrenomycetes.



1. **Hypoxylon fuscum** (Pers. sub Sphaeria) Fr. S. Veg.

syn: cfr apud Nitschke pyren. I p. 35.

cfr Fuckel symb. myc. p. 234. Cooke hdb. p. 796. Saccardo myc. Ven. p. 152. f. it. del. 569. Karsten myc. fenn. I p. 39.

exs: Moug. et Nestler stirp. vog. 178. Schweiz. crypt. 530. bad. crypt. 151. Rabh. f. eur. 628. Fuckel f. rhen. 1054. Plowright sphaer. brit. I 20 Thümen f. austr. 664. myc. un. 367 (? 871). Saccardo myc. Ven. 674 (675?). Cooke f. brit. II 467. Rehm Ascomyc. 221. Ellis f. n. am. 678 (J—) (? Ravenel f. am. 184 J—, Thümen myc. un. 1861).

Asci cylindranei, 90—100/6, 8 spori. Sporidia elliptica, plerumque subcurvata, 1 cellularia cum 1—2 nucleis magnis, hyalina, dein fusca, monosticha, 10—12/6—7. Paraphyses articulatae, ramosae. Jodii ope apex ascorum coerulescit.

Ad ramum siccum (Coryli?). Kaposvár (Somogy) 1872 Lojka sub 70.

2. **Nummularia Bulliardi** Tul.

syn: Sphaeria nummularia DC. Hypoxylon — Bull.

cfr Nitschke pyren. I p. 60. Fuckel symb. myc. p. 236. Cooke hdb. p. 798.

exs: Moug. et Nestler stirp. vog. 374. Fuckel f. rhen. 1062. Ellis f. n. am. 85 (? sine hymenio in herb. meo.)

Asci evanidi. Sporidia elliptica, 1 cellularia, plerumque nucleis 2 magnis apicalibus instructa, fusca, — 12/7. Exemplar valde mancum!

Ad ramum fagineum. Kaposvár (Somogy) 1872 Lojka sub 65.

3. **Poronia punctata** (L. sub Peziza) Fr. S. V.

syn: Sphaeria — Fr. syst. Sph. Poronia Pers.

cfr Nitschke pyren. I p. 19. Cooke hdb. p. 791. Karsten

myc. fenn. I p. 36. Hansen champ. stere. Dan. p. 14 (ubi cit. syn. *Peziza coriacea* Bull = *Patellaria* Fr. = *Lecanidion* Rabh.)

exs: Moug. et Nestler stirp. vog. 958. Rabh. hb. myc. II 45, f. eur. 2020. Cooke f. brit. I 468. II 213. Plowright sphaer. brit. II 9. Rehm Ascomyc. 168.

Asci cylindracci, apice truncati et incrassati, 100/18, 8 spori. Sporidia elliptica, fusca, 1 cellularia, massa gelatinosa tenui cincta, 18—24/9; plerumque 1 sticha. Paraphyses ramosae, articulatae, 3—5 mikr. crassae. Perithecium prosenchymaticum. Jodii ope apex ascorum valde coeruleescit.

Ad fimum vaccinum prope Tököl in insula Danubii Csepel (Pest). 6/1873. Lojka sub 1989.

Edita in Rehm Ascomyc.

4. **Valsaria insitiva** Ces. et De N.

syn: *Sphaeria* — Tode. *Diatrype* — Fr. S. V. *Melogramma rubricosum* Fr. Tul. *Myrmaecium* — Nitschke.

cfr Fuckel symb. myc. p. 227. Thümen Beiträge II p. 29. Saccardo myc. Ven. p. 148 tab. XV f. 5—10, f. Ven. IV p. 20. V p. 183 (declarat *V. rubricosam* et *insitivam* esse diversas species!), f. it. del. 640. Michelia I p. 31.

a. f. *quercicola* Fuckel.

exs: Fuckel f. rhen. 1821. Rehm Ascomyc. 170 a, b. Rabh. f. eur. 2112 (? 1128).

Asci cylindracci, 8 spori, — 120/10—12. Sporidia biscociformia, nempe 2 cellularia, medio plusminusve constricta et utraque cellula nucleo 1 magno instructa, episorio saepe scabro, hyalina, dein fusca, monosticha, — 15/—8; Paraphyses tenerae, filiformes, guttulate. Jod —

Ad ramum quercinum siccum. Toponár (Somogy) in Hungaria 1872 Lojka. sub 175.

b. f. *viticola* Fuckel symb. myc. p. 228

exs. Fuckel f. rhen. 1822.

cfr *Myrmaecium lophiostomum* Hazslinszky in Közlem. 1873 p. 55.

Ad sarmenta sicca *Vitis vinif.* Kaposvár (Somogy) 1872. Lojka sub 147.

c. f. *Syringae*.

Ad ramulos siccos *Syringae* vulg. spontanee crescentis prope Plavisevicza in Hung. 9/1872 Lojka sub 1001.

d. f. *Viburni*.

Ad ramos siccos Viburni Opuli in horto Esterházyano Kaposvár (Somogy). 5/1871 Lojka.

5. **Melogramma spiniferum** (Wallr. sub Sphaeria) DN.

syn: Diatrype podoides (Sphaeria—Wallr.) Fr. S. V.

cfr Fuckel symb. myc. p. 226. Saccardo myc. Ven. p. 147.

tab. XIV f. 68—69; f. it. del. 541. Michelia II p. 66.

exs: Fuckel f. rhen. 1000 (sub Bertia). Kunze f. sel. 153 Saccardo myc. Ven. 237. Moug. et Nestler stirp. vog. 1074 (sub Sphaeria podoides Pers.). Spegazzini dec. myc. 93. Thümen myc. un. 1860.

Asci cylindraceo-clavati, 8 spori, 180/14. Sporidia dactyloidea, obtusa, subcurvata, 8 cellularia, cellulis finalibus hyalinis, ceteris fuscis, — 66/6, disticha. Paraphyses hyalinae, ? ramosae, guttulate, c. 3 mikr. crassae. Jod —

Ad truncum fagi emortuum. Kaposvár (Somogy). Lojka 1872 sub 65.

6. **Diatrype Stigma** (Hoffm. sub Sphaeria) Fr.

syn: Stictosphaeria Hoffmanni Tul.

cfr Nitschke pyren. I p. 65. Fuckel symb. myc. p. 230.

Cooke hdb. p. 811. Saccardo myc. Ven. p. 150, f. it. del. 464. Karsten myc. fenn. I p. 150.

exs: Mougeot et Nestler stirp. vog. 372, 373 (sub Sphaeria decorticans). Rabh. hb. myc. II 529, f. eur. 820. Fuckel f. rhen. 1043 (1044? propter sporas minores). Plowright sphaer. brit. I 32. Thümen f. austr. 763. Fuckel f. rhen. 2263. Cooke f. brit. II 217. Saccardo myc. Ven. 943, 944. Rehm Ascomyc. 220 a, b (? Ravenel f. am. 359 a, b. Ellis n. am. f. 491.)

Asci fusiformes, longe stipitati, 8 spori, pars sporifera c. 45 mikr. long. Sporidia disticha, oblonga, obtusa, subcurvata, flavidula, 1 cellularia, 9—11/2,5. Paraphyses filiformes. Jod —

Ad ramos siccos Pruni domesticae prope Malomviz (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1873 Lojka.

Edita in Rehm Ascomyc. 220 a.

7. **Eutypa spinosa** (Pers. sub Sphaeria —) Tul.

syn: Valsa - Nke pyren. I p. 127. Diatrype Berengeriana Sacc.

cfr Fuckel symb. myc. p. 214. Michelia II p. 51.

exs: Fuckel f. rhen. 1050. Rabh. f. eur. 936 a, b. Moug. et Nestler stirp. vog. 376. bad. crypt. 831. Cooke f. brit. II 675.

Asci fusiformes, 8 spori. Sporidia oblonga, obtusa, 1 cellularia, recta vel subcurvata, dilute flavidula, 5/2,5, disticha.

Ad lignum fagineum in regione Turkului infra alpem Retyezát (Hunyard) Transsylvaniae. 7/1872 Lojka sub 1616.

8. **Eutypa lejoplaca** (Fr. syst. sub Sphaeria, S. Veg. Sc. sub Diatrype) Nitschke pyren. I p. 151.

cfr? Cooke hdb. p. 800.

exs: Fuckel f. rhen. 1047. Plowright sphaer. brit. 13,14. (? Ellis f. n. am. 679).

Asci fusiformes, stipitati, c. 45/6, 8 spori. Sporidia oblonga, obtusa, subcurvata, 1 cellularia, dilute flavidula, disticha, 7—8/2,5. Paraphyses filiformes, crassae. Jod —

Ad sarmenta putrida Vitis viniferae prope Kaposvár (Somogy) 5/1871. Lojka.

9. **Eutypa flavovirens** (Hoffm. Pers. Fr. syst. sub Sphaeria) Tul. syn: Valsa — Nke pyren. I p. 141. Diatrype — Fr. S. Veg. cfr Fuckel symb. myc. p. 213. Cooke hdb. p. 799. Karsten myc. fenn. II p. 128. Saccardo f. Ven. IV p. 16; f. it. del. 471.

exs: Moug. et Nestler stirp. vog. 375. Rabh. hb. myc. II 48. Fuckel f. rhen. 1049, 1825. Plowright sphaer. brit. I 23. Cooke f. brit. II 469. Rehm Ascomyc. 219. Thümen myc. un. 1364.

Asci fusiformes, longe stipitati, pars sporifera 20—24/6, 8 spori. Sporidia oblonga, obtusa, subcurvata, dilute flavidula, 1 cellularia, disticha, 6/2. Paraphyses articulatae, c. 3 mikr. crassae. Ope liq. kali caust. materia flava perithecii solvitur, sed non decoloratur. Jod —

Ad ramulos siccos Pruni Coryli et Betulae prope Malomviz (Hunyard) Transsylvaniae. 8/1873 Lojka.

Edita in Rehm Ascomyc. 219.

10. **Eutypa aspera** (Nitschke pyren. I p. 132 sub Valsa) Fuckel symb. myc. p. 214.

syn: Eutypa polycocca var — Karsten myc. fenn. II p. 128. Eutypa aspera Fr. cfr Cooke in Grevillea VI p. 128.

cfr Saccardo f. Ven. IV p. 16.

exs: Fuckel f. rhen. 1981. Rehm Ascomyc. 218.

Asci fusiformes, longe stipitati, 8 spori, c. 90/6. Sporidia oblonga, obtusa, subcurvata, 1 cellularia, dilute flavidula, disticha in superiore asci parte, c. 7/2,5.

Ad radices Evonymi verrucosi in valle Nuksoraensi infra alpem Retyezát (Hunyard) Transsylvaniae. 1873 Lojka sub 2464.

Videtur ad hanc speciem trahenda!

11. **Cryptovalsa ampelina** (Nke pyren. I p. 156 sub Valsa).

cfr Fuckel symb. myc. p. 212. Saccardo myc. Ven. p. 211.
syn: *Echusias Vitis* Hazslinszky Közlem. X 1873 p. 51 tab.

I f. 1 - 2.

exs: Fuckel f. rhen. 1824 (sub *V. protracta*). Rehm Ascomyc. 79.

Asci fusiformes, longe stipitati, c. 150/6 - 7, c. 30 spori Sporidia oblonga, obtusa, subcurvata, dilute flavidula, 7 - 8/2,5.

Ad sarmenta putrida *Vitis viniferae* prope Kaposvár (Somogy) 5/1871 Lojka.

Edita in Rehm Ascomyc. 79.

12. **Cryptovalsa Pruni** Fuckel symb. myc. Nachtrag I p. 321.

cfr Saccardo in *Michelia* I p. 22 (qui syn: *Cryptovalsa Rabenhorstii* declarat!)

exs: Fuckel f. rhen. 2336.

Asci clavati, longe stipitati, c. 100/7, 80 - 90 spori. Sporidia oblonga, obtusa, subcurvata, 1 cellularia, 5 - 6/2,5.

a. Ad ramulum siccum *Pruni* prope Kaposvár (Somogy) 1872 Lojka sub 146.

b. ibidem prope Malomviz (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1873 Lojka. (Sporidia 9/2,5, c. 30 in ascis.)

Specimina haud certa adhuc allata!

13. **Valsa** (*Leucostoma*) **cincta** (Fr. sub *Sphaeria*) Nitschke pyren. I. p. 228.

minime = *Valsa cincta* Curr. Linn. Trans. XXII. cfr Cooke hdb. p. 817.

cfr Fuckel symb. myc. p. 202. Revue myc. 11 p. 47.

exs: (? Fuckel f. rhen. 2140), Rehm Ascomyc. 224. Speciminulum huc ducendum videtur.

Asci elliptici, c. 40/8 - 9, 8 spori. Sporidia oblonga, obtusa, 1 cellularia, hyalina, subcurvata, 12/2,5, disticha.

Ad ramum siccum *Pruni* prope Malomviz Transsylvaniae. Lojka.

14. **Valsa** (*Monosticha*) **Syringae** Nitschke pyren. I p. 189.

exs: ? Thümen myc. un. 1363 (non Ascomycetes in explr meo.) Speciminulum huc forsitan trahendum!

Asci clavati, 8 spori, 36/5. Sporidia oblongo-elliptica, obtusa, recta vel subcurvata, 1 cellularia, hyalina, disticha, 6/2,5.

Ad ramulos *Syringae vulgaris* prope Cetati Boli (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1873 Lojka sub 2095.

15. **Valsa** (*Monosticha*) **Orni** Rehm nov. spec.

Stroma e basi suborbiculari conico-convexum, in cortice in-

teriore nidulans ejusque materiam non mutans, epidermide circa ostiola facile solubili, pustulata. Perithecia in singulo stromate 8—12, monosticha, dense stipata, globosa, mediocria, in collum attenuata. Ostiola epidermidem vix superantia, in disco minuto aggregata, rotundata, atra, poro pertusa, sessilia. Asci clavati, 8 spori. Sporidia cylindrica, obtusa, vix curvata, 1 cellularia, hyalina $15/3-4$.

Ad ramum siccum Fraxini Orni in valle Kolczvárensi (Hunyad) Transsylvaniae. 1873 Lojka.

Secundum speciminulum in herb. meo videtur nova species declaranda!

16. **Valsa** (Monosticha) **decorticans** (? Fr. sub Sphaeria) Nitschke pyren. I p. 194.

(non = Fuckel symb. myc. p. 199, exs. Fuckel f. rhen. 606 = *V. ceratophora* f. *quericola*.)

exs: bad. crypt. 826 (sub *Valsa* *megas* Awd). non Ellis n. am. f. 496 (verisimiliter = *ceratophora*).

Asci clavati, 8 spori, $90/6-7$. Sporidia oblonga, obtusa, subcurvata, 1 cellularia, disticha, $12/3$.

Ad ramum corticatum Fagi. Kaposvár (Somogy). 1872 sub 153.

Exacte convenit cum exemplaribus badensibus exsiccatis.

17. **Valsa** (Circinnata) **acclinis** (Fr. sub Sphaeria).

cfr Nitschke pyren. I p. 207.

Asci clavati, substipitati. 8 spori, — $60/8$; Sporidia oblonga, obtusa, 1 cellularia, subcurvata, hyalina, disticha, — $11/2,5$.

Ad ramulos Pyri Mali. Malomviz (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1873 Lojka.

Exemplaria incertae sedis!

18. **Valsa** (Circinnata) **Cypri** (Tul. sub Sphaeria) Nitschke pyren. I p. 206.

cfr Saccardo f. Ven. IV 27. Karsten myc. fenn. II p. 142. var. *Fraxini*.

(f. spermog. *Sphaeria* *pruinosa* Fr. cfr Cooke hdb. p. 558)

exs: (Moug. et Nestler stirp. vog. 968, Rabh. f. eur. 1020, Thümen f. austr. 1266, status spermogoniferi!) Rehm Ascomyc. 226.

Asci elliptici, breviter stipitati, — $60/12$, 8 spori. Sporidia cylindrica, obtusa, recta vel subcurvata, 1 cellularia, hyalina, disticha, — $21/6$. Paraphyses articolatae. Jod —

Ad ramos siccos Fraxini Orni in valle Kolczvárensi infra alpem Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1873 Lojka.

Edita in Rehm Ascomyc. 226.

19. **Diaporthe** (Chorostate) **tessera** (Fr. syst. sub Sphaeria).
 Fuckel symb. myc. Nachtrag I p. 318.

cfr ? Saccardo f. Ven. nov. V p. 180 (appendiculi sporarum).

exs: Fuckel f. rhen. 592 (sub Wüstneia). Kunze f. sel. 119 (ubi injuste citatur syn: Rehm Ascomyc. 176). (? Saccardo myc. Ven. 664. Thümen myc. un. 1264).

Asci fusiformes, 8 spori, 66/—9; Sporidia elliptica, subacutata, medio subconstricta, 2—4 cellularia, singulis cellulis 1 nucleo magno praeditis, recta, hyalina, 15/3—5, disticha. Paraphyses filiformes, guttulate. Jod —

Ad ramulos putridos Coryli. Lunkány in Hung. 7/1872 Lojka sub 1882.

20. **Diaporthe** (Euporthe) **incrustans** Nke pyren. I p. 267.

Asci clavati, 8 spori, 50/9; Sporidia elliptica, acuta, recta vel navicularia, medio subconstricta, 2 cellularia, utraque cellula nucleis 2 magnis praedita, hyalina, disticha 10—12/—4.

Ad caulem Umbelliferae siccam prope Soborsin in Hung. 7/1872 Lojka sub 1888.

Exemplar incertae adhuc sedis!

21. **Diaporthe** (Tetrastagon) **inaequalis** (Curr. sub Sphaeria) Nitschke pyren. I p. 285.

syn: Sphaeria Fuckelii Duby. Diatrype inaequalis Cooke hdb. p. 813.

cfr Saccardo myc. Ven. p. 140 tab. XIII f. 76—78. Fuckel symb. myc. p. 209.

exs: Fuckel f. rhen. 919. Rabh. f. eur. 2223. Rehm Ascomyc. 276 a, b.

Asci cylindranei, 8 spori — 90 8. Sporidia biscociformia, obtusa, medio subminusve constricta, 2 cellularia, plerumque utraque cellula nucleo 1 magno centrali praedita, hyalina, plerumque 1 sticha 15/—8. Paraphyses filiformes, c. 4 mikr. crassae, guttulate. Jod —

Ad ramulos emortuos Cytisi hirsuti in sylva Hársas prope Töröcske (Kaposvár, Somogy). 5/1871 Lojka.

Edita in Rehm Ascomyc. 276 b.

22. **Diaporthe** (Tetrastagon) **Sarothamni** Nke pyren. I p. 303.

cfr Fuckel symb. myc. p. 207.

exs: Fuckel f. rhen. 2345. Plowright sphaer. brit. III 31, Thümen myc. un. 1070. Rabh. f. eur. 2428 (non Cooke f. brit. I 671).

Asci elliptici, 8 spori, 60/7—8. Sporidia elliptica, subacuta,

plerumque recta, medio subconstricta, 2 cellularia, utraque cellula nucleis 2 instructa, hyalina, disticha, — 18/3,5.

Ad ramulum emortuum Cytisi austriaci prope Szent-Miklós in insula Danubii Csepel (Pest). 6/1873 Lojka sub 1993.

23. **Dothidea Sambuci** (Pers. sub Sphaeria) Fr. syst.

cfr Fuckel symb. myc. p. 222.

exs: Kunze f. sel. 158. Fuckel f. rhen. 1007. Saccardo myc. Ven. 648.

Exemplar quoad Hymenium prorsus inevolutum!

Ad ramulum emortuum Sambuci nigrae. Malomviz (Hunyad) Transsylvaniae. 1873 Lojka.

24. **Mazzantia Napelli** (Ces. sub Dothidea) Passerini, Sacc.

cfr Sacc. f. Ven. IV p. 25.

exs: Rabh. f. eur. 1272, 2123.

Asci elliptici, teneri, apice subincrassati, 8 spori, 60—90/9—12. Sporidia elliptica, 1 cellularia, nucleis 2—3 submagnis praedita, hyalina, disticha, 15/—5, saepe una vel utraque apice filiformiter breviter appendiculata. Paraphyses tenerrimae, filiformes, guttulae, — 4 mikr. crassae. Jod —

An caules putridas Aconiti circa lacum Zenoga infra alpem Retezát (Hunyad) Transsylvaniae. alt. c. 6000'. 8/1873 Lojka.

25. **Thyridium vestitum** (Sphaeria — Fr. syst., Valsa — Fr. S. Veg. Tul.) Fuckel symb. myc. p. 195 p. p.

syn: Cucurbitaria vagans Sacc. myc. Ven. p. 122 t. XII f. 34—38, f. ital. 402. Fenestella vestita Sacc. in Michelia I p. 50.

exs: Fuckel f. rhen. 954. Saccardo myc. Ven. 1272. Rehm Ascomyc. 179 (? Thümen f. austr. 859).

Asci cylindrico-clavati, 8 spori, 150/15. Sporidia subovoidea vel oblonga, obtusa, hyalina, dein fusca, transverse 6—8 septata, longitudinaliter semel, inde muriformia polyblastata, 1 sticha, 15—18/9—10. Paraphyses filiformes, guttulae, c. 1,5 mikr. crassae. Jod —

Ad ramulos siccos Coluteae arboreae spontaneae crescentis prope Tököl in insula Csepel (Pest). 6/1873 Lojka.

Edita in Rehm Ascomyc. 179!

26. **Thyridaria Ailanthi** Rehm nov. spec. 1875.

Stromata valsea, conoidea, sub epidermide nidulantia. Perithecia globosa, mediocria, rubrofusca, parenchymatice contexta, c. 8 conglobata, in collum brevissimum attenuata atque ostiolo conoideo-truncato, fuscidulo, poroque instructo epidermidem fissam vix superantia.

Asci cylindraceo-clavati, 8 spori, 75/6—7; Sporidia elliptica, primitus 2 —, denique 4 locularia, ad septa subconstricta, singulis cellulis plerumque nucleo 1 magno praeditis, fuscidula, incurvata, monosticha, 12 15/3—4. Paraphyses tenerae, ramosae. Jod —

Ad ramos siccos Ailanthi glandulosae in horto Esterházyano Kaposvár (Somogy). 7/1871 Lojka.

27. **Aglaospora profusa** (Fr. syst. sub Sphaeria) Tul. De N. syn: Valsa — Fr. S. V. Sc. (? Massaria Seiridii B. et Br.) cfr Cooke hdb. p. 838. Fuckel symb. myc. p. 187. Saccardo myc. Ven. p. 125 tab. XII f. 49—50, f. it. del. 441.

exs: Moug. et Nestler stirp. vog. 871 p. p. Schweiz. crypt. 622. Rabh. f. eur. 733 a, b, 1137, 1441 (sub Cucurbitaria elongata), hb. myc. II 727. Fuckel f. rhen. 583. bad. crypt. 823. Saccardo myc Ven. 650. Thümen myc. un. 969. Rehm Ascomyc. 45. Ellis n. am. f. 172.

Asci cylindraceo-clavati, crassi, 4 spori, 180/24. Sporidia oblonga, obtusa, recta, 4 cellularia, nucleis magnis specificè ordinatis, hyalina, dein fusca, monosticha, — 45/12. Paraphyses ramosae. Jod —

Ad ramos emortuos Robiniae Pseudacaciae. Kaposvár (Somogy). 1872 Lojka.

28. **Thyronectria pyrrochlora** (Awd sub Nectria). Saccardo in Michelia III p. 325.

exs: Rabh. f. eur. 1234. Rehm Ascomyc. 40.

Asci clavati, c 80 long., 8 spori. Sporidia oblonga, obtusa, hyalina, transverse 8 septata, longitudinaliter pluries, inde muriformia, polyblasta, — 21/12, 1—2 sticha. Paraphyses filiformes. Jod —

Ad sarmenta Vitis viniferae putrida. Kaposvár (Somogy) 5/1871 Lojka.

29. **Nectria lecanodes** Ces.

? syn: N. peziza (Tode) Fr. * minor. Desm.

cfr Saccardo in Michelia III p. 290. Fuckel symb. myc. p. 178. Karsten myc. fenn. II p. 215.

exs: Rabh. hb. myc. II 525. Fuckel f. rhen. 2050. Cooke f. brit. II 564. Rehm Ascomyc. 38. Thümen myc. un. 1746 (? Plowright sphaer. brit. III 12).

Asci cylindracei, 8 spori. Sporidia obtusa, elliptica, medio subconstricta, 2 cellularia, unaquaque cellula 2—4 nucleis magnis praedita, hyalina, monosticha, — 10/—4. Paraphyses? Jod —

Parasitica in thallo vivo Peltigerae horizontalis in sylva prope Eperjes. 10/1869 Lojka sub 604.

30. **Nectria episphaerica** (Tode sub Sphaeria) Fr. S. V.

cfr Fuckel symb. myc. p. 181. Saccardo in Michelia I p. 291, myc. Ven. p. 123. Cooke hdb. p. 785. Karsten myc. fenn. II p. 124.

exs: Fuckel f. rhen. 981. Thümen myc. un. 766. Ravenel f. am. 340. Plowright sphaer. brit. I 11. Cooke f. brit. I 493. Rabh. f. eur. 642. Rehm Ascomyc. 585. Ellis n. am. f. 469 *a, b*.

Asci cylindranei, 8 spori, 45/6. Sporidia ovoidea vel oblonga, obtusa, 2 cellularia, medio interdum subconstricta, interdum cellulis inaequalibus, monosticha, hyalina, —8/—5. Paraphyses ramosae. Jod —

a. Ad Diatrype Stigma. Malomviz (Hunyad) Transsylvaniae; 8/1873 Lojka.

Exemplaria involuta!

b. ad Hypoxylon? prope Kaposvár (Somogy). Lojka sub 71.

c. ad Anthostoma Schmidtii (?). Kaposvár (Somogy). 1871 Lojka sub 197.

31. **Nectria minutissima** Rehm nov. spec.

Perithecia minutissima, nudo oculo vix conspicua, conoidea, tremelloidea, eburnea, dispersa, in thallo Ophioboli rubelli sessilia. Asci clavati, 8 spori. Sporidia elliptica, subobtusa, medio subconstricta, 2 cellularia, quaque cellula nucleo 1 magno praedita, disticha, hyalina, 12—14/4. Paraphyses? Jod —

Ad caules Umbelliferarum putridas in horto Eszterházyano Kaposvár (Somogy). Lojka 1871.

Species difficillime rite cognoscenda ob minutiam perithecorum, inde forsitan adhuc dubia!

32. **Nectria Cucurbitula** (Tode sub Sphaeria) Fr. S. V.

cfr Fuckel symb. myc. p. 180. Saccardo in Michelia I p. 290, 409.

exs: Fuckel f. rhen. 983. Schweiz. crypt. 323. Rabh. hb. myc. II 248. f. eur. 1235. Cooke f. brit. I 581. (? Kunze f. sel. 105).

Asci cylindranei, 8 spori. Sporidia biscociformia, apice obtusa vel subaeutata, 2 cellularia, quaque cellula nucleo 1 magno praedita, hyalina, monosticha, —14/6. Paraphyses filiformes.

Ad Abietum corticem prope Teplicska et Zatracsano infra alpem Dzurowa (Liptó). 8/1872 Lojka sub 1358.

33. **Nectria chlorella** (Fr. El. sub Cenangium) Tul. carp.

cfr Michelia I p. 289 (sporidia 1 septata!), II p. 325.

Asci cylindranei, rarius fusiformes, 8 spori, c. 60/—7. Sporidia ovoidea vel elliptica, obtusa 2 cellularia, ad septa haud constricta,

hyalina, 1 (rarius 2) sticha, —12/—5. Paraphyses filiformes. Perithecium viridiflavum, parenchymaticum. Jod —

Ad ramulos emortuos Abietis. Baudrów in Galicia australi. 8/1869 Lojka sub 6.

34. **Nectria cinnabarina** (Tode et Fr. sub Sphaeria) Tul.

cfr Fuckel symb. myc. p. 177. Cooke hdb. p. 781. Saccardo in Michelia I p. 289, myc. Ven. p. 122. Karsten myc. fenn. II p. 212.

exs: ? Moug. et Nestler stirp. vog. 570. Rabh. hb. myc. II 633, f. eur. 324, 924, 1631. Thümen f. austr. 1050. Fuckel f. rhen. 2657. Cooke f. brit. II 474. Saccardo myc. Ven. 767 (? 926). Ravenel f. am. 339. Plowright sphaer. brit. I 7. Ellis n. am. f. 468. Rehm Ascomyc. 184 (f. obscurata).

Asci cylindraceo-clavati, 8 spori, c. 60 long. Sporidia oblonga, obtusa, recta, medio non constricta, 2 cellularia, hyalina, disticha, —18/—5. Paraphyses filiformes.

a. Ad ramulos siccos. Kaposvár (Somogy) 1871 Lojka sub 185.

b. Ad sarmenta putrida Vitis viniferae. Kaposvár (Somogy) Lojka sub 119.

Sporidia 12/4, itaque forsitan N. viticola B. et C. (cfr Saccardo in Michelia III p. 203).

c. Ad ramulos emortuos Sambuci nigrae. Malomviz (Hunyad) Transsylvaniae 8/1873 Lojka.

Exemplar plane involutum itaque dubium!

35. **Gibberella pulcaris** (Fr. syst. sub Sphaeria). Saccardo in Michelia I p. 43, 317.

syn: Gibbera — Fr. S. V. Sc., Fuckel symb. myc. p. 167. Botryosphaeria — Ces. et De N., Nectria — Tul.

cfr Saccardo myc. Ven. p. 118 tab. XVII f. 10; f. Ven. IV p. 5. Cooke hdb. p. 780.

exs: Rabh. hb. myc. II 735, 644 (sub Sphaeria cyanogena Desm.). Fuckel f. rhen. 789. Saccardo myc. Ven. 652, 653 (sub f. baccata Wallr. non = baccata Fuckel symb. myc. p. 306), 1465, 1466. Rehm Ascomyc. 230, 489.

Asci elliptici, tenerrimi, 8 spori, —70/12. Sporidia elliptica, subobtusa, recta vel subcurvata, 4 cellularia, ad septa interdum subconstricta, disticha, hyalina, — 21/5. Paraphyses ramosae? Perithecium parenchymaticum, coeruleum. Jod —

Ad ramulos siccos Sambuci nigrae prope Malomviz (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1873 Lojka.

Edita in Rehm Ascomyc. 230.

36. **Gibberella pulicaris** (Fr.) Saccardo.

var. *Saubinetii* Dur. et Montg sub *Sphaeria*).

syn: *Gibbera* — Fuckel symb. myc. p. 168. *Botryosphaeria dispersa* De N., *B. cyanogena* (Desm. sub *Sphaeria*), *Gibbera flacca* (Wallr. sub *Sphaeria*) Fuckel symb myc. p. 168.

cfr Saccardo myc. Ven. IV 5—6, myc. Ven. p. 117. tab. XII f. 8—9. *Michelia* I p. 317, 513. Niessl in *Hedwigia* 1873 p. 131.

exs: Saccardo myc. Ven. 927, 1467, 1468. Ellis n. am. f. 81. Fuckel f. rhen. 976, 2046. Rehm Ascomyc. 381.

Asci fusiformes, teneri, 8 spori, 60/10. Sporidia elliptica, 2 cellularia, hyalina, disticha, 18/4 - 6. Paraphyses filiformes. Perithecium parenchymaticum, coeruleum.

Ad caules putridas Zeae *Maydis* prope *Kasposvár* (Somogy). 1872 *Lojka* sub 184.

Exemplar involutum, itaque sporidia 2 cellularia!

37. **Calonectria dacrymycella** (Nyl. sub *Sphaeria*) Saccardo.

syn: *Nectria* — Karsten myc. fenn. II p. 216.

cfr Nyl. pez. fenn. p. 92, flora 1863 p. 323. *Michelia* I p. 314, II 163.

exs: Rehm Ascomyc. 232 *a*, *b* (sub *Nectriella*).

Asci fusiformes, 8 spori, — 70/11. Sporidia elliptica, subacutata, 2 cellularia, utraque cellula nucleis 1 - 2 magnis praedita, medio interdum subconstricta, recta, hyalina, disticha, — 18/—4. Paraphyses ramosae, c. 3 mikr. crassae. Jod —

Ad caules putridas *Umbelliferarum* prope lacum *Zenoga* infra alpem *Retyezát Transsylvaniae*, alt. c. 6000'. 8, 1873 *Lojka*.

Edita in Rehm Ascomyc. 232 *a*.

Species distinctissima et in alibus editissimis *Tyrolensibus* iterum iterumque a me observata.

38. **Calonectria lichenicola** (Ces. sub *Cryptodiscus*) Rehm.

syn: ? *Nectriella Robergei* Desm. (cfr Nyl. pez. fenn. p. 90). *Nectria lichenicola* Saccardo in *Michelia* I p. 289. *N. Peltigerae* Ph. et Pl. (cfr *Grevillea* IV p. 223). *Nectriella carnea* Fuckel symb. myc. p. 176 (? tab. IV f. 19); *Nectria erythrinella* (Nyl. sub *Sphaeria*) Tul. (cfr Karsten myc. fenn. II p. 217. *Michelia* I. p. 289). ? *Nectria Kalchbrenneri* Fuckel symb. myc. p. 177. ? *N. Peziza* Fr. (cfr Arnold in *Flora* 1881 p. 327, Winter in *Flora* 1872 p. 523).

exs: Rabh. hb. myc. II 523. Rehm Ascomyc. 37. (? Fuckel f. rhen. 1835. Plowright sphaer. brit III 13.

Asci fusiformes vel elliptici, 8 spori, c. 60/15. Sporidia elliptica vel ovoidea, obtusa, 2 cellularia, medio subconstricta, quaque cellula 1—2 nucleata, hyalina, disticha, 15—18/7—8. Paraphyses?

Ad thallum *Peltigerae* horizontalis in valle Kolczvárensi prope rivulum Riu sor infra alpem Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1873 Lojka sub 2264.

39. **Cucurbitaria pithyophila** (Kunze et Fr. sub *Sphaeria*) De N. schem. p. 214.

cfr Fuckel symb. myc. p. 172 Saccardo f. it. del. 522.

exs: Rehm Ascomyc. 147 (? Rabh. f. eur. 645, 1337, Fuckel f. rhen. 1814).

Asci cylindranei, apice incrassati, 8 spori, 105/ 8. Sporidia elliptica, subobtusa, recta, hyalina, demum fuscidula, monosticha, 4—8 cellularia, interdum una alterave media cellula semel longitudinaliter divisa, ad septa vix subconstricta, -- 18/5. Paraphyses ramosae. Jod —

Ad ramum siccum Pini. In monte Siodelko prope balneum Szczawnica in Galicia. 1869 Lojka 978.

40. **Cucurbitaria elongata** (Fr. sub *Sphaeria*) Grev.

cfr Fuckel symb. myc. p. 174. Cooke hdb. p. 840. Saccardo myc. Ven. p. 120 tab XII f. 25—27. f. it. del. 529.

exs: Fuckel f. rhen. 970 (? 1815). Moug. et Nestl. stirp. vog. 873 p. p. Rabh. f. eur. 882. Thümen myc. un. 565 (? f. austr. 252). Rehm Ascomyc. 185, 336 (? Saccardo myc. Ven. 95), non Plowright sphaer. brit. I 54 (*Lophiostoma*).

Asci cylindranei, 8 spori, 125/10. Sporidia elliptica, recta, transverse 4—6 septata, longitudinaliter plerumque semel, ad septa subconstricta, hyalina, demum fuscidula, monosticha, 18 24/9—10. Paraphyses articulatae, ramosae. Jod —

Ad caules siccas *Astragali* virgati in terra arenosa dicta „Buczka“ in insula Csepel Danubii (Pest). 1873 Lojka.

Edita in Rehm Ascomyc. 185.

41. **Cucurbitaria acerina** Fuckel symb. myc. p. 172 tab. IV f. 3.

exs: Fuckel f. rhen. 2255 (explr meum nimis mancum!)

Asci cylindranei, 8 spori. Sporidia oblonga, obtusa, transverse in cellulas 6 septata, singula semel longitudinaliter, medio subconstricta, hyalina, dein fuscidula, monosticha, 18/7—8. Paraphyses filiformes. Jod —

Ad ramulos siccos *Aceris* camp. in horto Esterházyano. Kaposvár (Somogy). 10/1871 Lojka sub 2533.

42. **Staurosphaeria Lycii** (Duby sub Dothidea) Rabh.

syn: *St. varians* (Hazslinszky sub *Cucurbitaria*) Niessl.

exs: Zopf et Sydow myc. march. 82. Rehm Ascomyc. 593. Rabh. f. eur. 55, 1537 (hb. myc. II 736. Kunze f. sel. 261).

Perithecia sparsa, rotunda, atra, c. 1 mm. diam., sub peridermio pustulatim elevato nidulantia, peridermio vario modo dilacerato et ostiolo, primitus albido, dein denigrato, perspicue late pertuso, ostiolo dein prorumpente. Stratum corticis interioris longe lateque nigrificatum. Perithecia parenchymatica, fusca. Asci cylindracei, 8 spori, 200/15. Sporidia elliptica, subacuminata, primitus 4 cellularia, dein longitudinaliter utraque cellula media septata, denique 6–12 cellularia, ad septa subconstricta, fuscidula, 15–17/9–10. Paraphyses crassae, ramosae. Jod —

Ad ramulos siccos Lycii barbari in horto Esterházyano Kaposvár (Somogy). 5/1871 leg. Lojka.

Exemplaria sporis paullulum minoribus a forma normali divergunt!

43. **Bertia moriformis** (Tode sub *Sphaeria*) Fr. S. V. et De N cfr Fuckel symb. myc. p. 164. Cooke hdb. p. 861. Karsten myc. fenn. II p. 160. Saccardo f. it. del. 440.

exs: Fuckel f. rhen. 999. Moug. et Nestler stirp. vog. 382. Cooke f. brit. I 586, II 487. Plowright sphaer. brit. 67. Rehm Ascomyc. 442 (? Rabh. hb. myc. II 637).

Asci clavati, in stipitem brevem angustati, 8 spori, 120/18. Sporidia dactyloidea, obtusa, recta vel subcurvata, 1 (? 2) cellularia, nucleis 2–4 magnis praedita, hyalina, tristicha, — 36/4 · 8. Paraphyses articulatae, crassae. Jod —

a. Ad truncos Abietum putridos in valle Riu sor infra alpem Retyezát Transsylvaniae. 8/1872 Lojka sub 1875.

b. Ad ramum Pini decorticatum in regione Turkului infra alpem Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae. 7/1872 Lojka sub 1691.

44. **Bertia lichenicola** De N. in erb. critt. it. no 1190 (1864!) syn: *Rhagadostoma corrugatum* Koerb. par. p. 473. *Psilosphaeria* — Cooke in *Grevillea* VIII p. 85 (? *Sphaeria* — Cooke in *Grevillea* I p. 156).

cfr Anzi anal. lich. p. 26. Arnold fragm. lich. XVI in *Flora* 1874. Saccardo f. it. del. 439. (asci 4 spori!)

exs: Rabh. f. eur. 950. Rehm Ascom. 283.

Asci elliptici, stipitati, 2 spori, 90/15. Sporidia dactyloidea, obtusa, 1–2 cellularia vel 2–4 nucleis magnis instructa, recta vel subcurvata, hyalina, parallela, 40–42/6–8. Paraphyses? Jod —

a. Parasitica ad thallum Solorinae croceae. In jugo Tatrae, Kopa dicto. 8/1868 Lojka sub 162.

b. ibidem in cacumine alpis Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae, alt. 2477 m. 1874 Lojka sub 2999.

45. **Trematosphaeria (Winteria) lichenoides** Rehm nov. spec. 1875.

syn: Zignoella — Sacc. in Michelia I p. 347.

exs: Rehm Ascomyc. 285.

Perithecia — 0,5 mm diam., nigroviridula, haud carbonacea, dimidiata, semiglobosa, umbilicato-pertusa, in ligni dealbati superficie insidentia, denique foveolam nigrolimitatam relinquuntia, sparsa. Asci subclavati, 6—8 spori, 90/—11. Sporidia obtuse elliptica, 2—4 - 6 cellularia, quaque cellula 1— pluribus magnis nucleis praedita, ad septa haud constricta, 1—1½ sticha, hyalina, —20/—8. Paraphyses filiformes. Jodii ope Hymenium valde coerulescit.

Ad truncum Pini decorticatum circa lacum Zenoga infra alpem Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae. Lojka sub 2410.

(**Winteria** Rehm nov. subgenus Trematosphaeriae. Perithecia haud carbonacea, sed viridi — vel fusce parenchymatica, collabentia, coriacea, non apiculata, sed patellaeformia, ostiolo pertusa. Hymenium Jodii ope plerumque coerulescens).

46. **Zignoella transsylvanica** Rehm nov. spec.

Perithecia solitaria, in ramorum superficie insidentia, ita ut globosa, integra, c. 0,8 mm diam. immersa sint, sed pars conica c. 0,5 mm longa exstet, nigerrima, poro pertusa, fragilia. Asci cylindracei, apice incrassati, 8 spori, 250/9. Sporidia elliptica, subacuminata, hyalina, 20—24 locularia, monosticha, 45—50/—9. Paraphyses filiformes. Jod —

Ad ramum siccum Syringae vulgaris. „Slima Leorda“ prope Petrila (Hunyad) Transsylvaniae. 1873 Lojka sub 2085.

Species valde insignis!

47. **Trematosphaeria Morthieri** Fuckel symb. myc. Nachtrag I p. 306.

syn: Zignoella — Saccardo in Michelia I p. 347. Trematosphaeria picastra Fuckel symb. myc. p. 162.

exs: Fuckel f. rhen. 2447. Thümen myc. un. 167. Rehm Ascomyc. 87.

Perithecia dimidiata; Asci clavati, 8 spori, — 66/15. Sporidia cuneiformia, obtusa, recta, 4 cellularia, 18—21/6, hyalina, disticha. Paraphyses filiformes. Jod --

Ad truncum decorticatum Pini in sylva Kislakensis (Somogy).
1870 Lojka.

48. **Melanomma pertusum** (Pers. sub Sphaeria) Rehm.

s y n : Trematosphaeria — Fuckel symb. myc. p. 162.

c f r Karsten myc. fenn. II p. 90. Cooke hdb. p. 869. Michelia
I p. 345.

e x s : Plowright sphaer. brit. III 50. Saccardo myc. Ven. 691.

Asci clavati, 8 spori, 75/10. Sporidia elliptica, recta vel sub-
curvata, 2 cellularia, medio subconstricta, dein 4 cellularia, quaque
cellula nucleo 1 magno instructa, fuscidula, disticha, 18—24/—6.
Paraphyses filiformes. Jod —

Ad ramum decorticatum. Kaposvár (Somogy). 1872 Lojka
sub 88.

Nescio an revera exemplar ad speciem nominatam, valde du-
biam pertineat! Sed cum allatis exs. congruit.

49. **Melanomma Catillus** Sacc. myc. Ven. p. 114. tab. XI.
f. 39—42.

c f r Michelia I p. 344. Saccardo f. it. del. 466.

Asci cylindracei, 8 spori. Sporidia elliptica, obtusa, 4 cellula-
ria, ad septa subconstricta, nucleolis praedita, fuscidula, monosticha,
15/—5. Paraphyses ramosae?. Jod —

Verisimiliter ad *Winteriam* trahenda species!

Ad lignum querneum putridum in valle Bilian infra montem
Domugled prope thermas Herculis (Szörény) in Hungaria. 1874
Lojka sub 2756.

50. **Melanomma Aspegrenii** (Fr. sub Sphaeria) Fuckel symb.
myc. p. 159 tab. III f. 29.

Asci cylindracei, 8 spori. Sporidia elliptica, subacutata, medio
constricta, 2—4 cellularia, quaque cellula nucleo 1 magno praedita,
fuscidula, monosticha, — 15/6. Paraphyses filiformes. Jod —

Ad ramulos putridos. Kaposvár (Somogy) 1872 Lojka sub 177

Mihi valde dubium, an exemplaria ad speciem nominatam
pertineant!

51. **Amphisphaeria pinicola** Rehm 1872!

s y n : Didymosphaeria alpina Hazslinszky in Közlem. 1873 p. 49.

e x s : Rehm Ascomyc. 135 (sub *Amphisphaeria betulina* Lahm).

Perithecia erumpentia, dein in cortice sessilia, semiglobosa,
breviter papillata poroque pertusa, dimidiata, atra, sparsa, c. 0,5 mm
diam. Asci cylindracei, (4—) 8 spori, 120/15. Sporidia elliptica,
primitus hyalina et 1 cellularia, dein medio constricta, 2 cellularia,

fusca, massa granulosa repleta, 1—2 sticha, 21—24/—10. Paraphyses ramosae, numerosissimae. Jodii ope Hymenium coerulescit.

Ad ramulos Pini Mughii in monte „Schusterknöppchen“ Tátra in Hung. 1873 Lojka sub 278.

52. **Lophiostoma** (Schizostoma) **vicinellum** Sacc. in Michelia III p. 335, 337; f. it. del. 240.

Asci clavati, 8 spori, 75/12. Sporidia fusiformia, subobtusa, medio constricta, 2 cellularia, quaque cellula nucleis 2 magnis praedita, fuscidula, disticha, 21/6—7. Paraphyses filiformes. Jod —

Ad ramulos siccos Artemisiae camp. in insula Csepel Danabii (Pest). 1873 Lojka sub 1992.

53. **Lophiostoma quadrinucleatum** Karsten myc. fenn. II p. 85. cfr Saccardo f. Ven. III p. 4, f. it. del. 222, 237. Grevillea VIII p. 107.

Asci clavati, 8 spori, 90/—10. Sporidia oblonga (— elliptica), obtusa, 4 cellularia, ad septa subconstricta, quaque cellula nucleo 1 mediocri praedita, —17/6, disticha. Paraphyses tenerrimae, filiformes. Jod —

a. Ad ramum siccum Rosae in valle Kolczvárensi infra alpem Retyezát Transsylvaniae. 8/1873 Lojka.

b. Ad ramum siccum Pruni spinosae prope Malomviz Transsylvaniae. 8/1873 Lojka.

54. **Lophiostoma perversum** De N.

cfr Sacc. f. Ven. III p. 4; f. it. del. 228. Michelia III p. 333, 339 (sporidia appendiculata!)

Asci clavati, 8 spori, —130/15. Sporidia fusiformia, acutata, recta vel subcurvata, 6 cellularia, saepe ad septa subconstricta, primitus quaque cellula nucleo 1 magno instructa, haud appendiculata, fuscidula, disticha, — 36/6. Paraphyses filiformes. Jod —

Ad lignum quercinum. Kaposvár (Somogy). 1872 Lojka sub 165.

55. **Lophiostoma macrostomum** (Tode sub Sphaeria) Fuckel symb. myc. p. 157.

syn: L. pseudomacrostomum Sacc. f. it. del. 234. Michelia I p. 334.

exs: Saccardo myc. Ven. 679. Rehm Ascomyc. 529.

Asci clavati, 8 spori, 105/9. Sporidia elliptica, subobtusa, 6—8 cellularia, ad septa vix constricta, recta, hinc inde una alterave cellula media semel longitudinaliter divisa, 1—1½ sticha, fusca, 15—20/5. Paraphyses filiformes. Jod —

Ad ramum decorticatum prope Bandrów in Galicia. 1869 Lojka

sub 811. Mihi dubium videtur, an exemplar ad hanc speciem pertineat, nempe sporidiis diversum ab Rehm Ascomyc. 529.

56. **Lophiostoma macrostomoides** De N.

cfr Sacc. in *Michelia* I p. 334, 339, f. it. del. 236.

exs: Rehm Ascomyc. 482.

(Asci clavati, 8 spori, 175/24. Sporidia elliptica, obtusa, 8—10 cellularia, cellula tertia ampliori ceteris, quaque cellula nucleo magno 1—2 centrali praedita, hyalina, demum fusca, massa gelatinosa tenui involuta, disticha, 30—36/10. Paraphyses ramosae. Jodii ope sporidia adulta coerulescunt).

Ad ramulos siccos Artemisiae camp. in insula Danubii Csepel (Pest). 1873 Lojka sub 1992.

Non congruit cum speciminibus in Rehm Ascom. sub hoc nomine editis. Itaque incertum, an recte sit denominata!

57. **Lophiostoma insidiosum** (Desm. sub Sphaeria) Ces. et De N.

syn: *Lophiostoma appendiculatum* Niessl, simillimum Karsten myc. fenn. II p. 84, caulium Fuckel symb. myc. p. 156, Nachtrag III p. 20.

cfr Winter in *Flora* 1872 p. 543. Saccardo myc. Ven. III p. 23 f. 11, f. it. del. 226, 227. *Michelia* I p. 340, 447. *Hedwigia* 1875 p. 70.

exs: Rabh. f. eur. 1871. Rehm Ascomyc. 88. Fuckel f. rhen. 927. Rabh. f. eur. 1725 (sub *Leptosphaeria Artemisiae*). Zopf et Sydow myc. march. 67.

Asci clavati, 8 spori, —90/14. Sporidia elliptica, obtusa, recta vel subcurvata, 6 cellularia, plerumque tertia cellula latiori, medio plus minusve constricta, subconstricta saepe ad cetera septa, saepe quaque cellula 1—2 nucleis praedita, utraque apice hyalina, filiformi, c. $\frac{1}{3}$ long. sporidii appendice instructa, fuscidula, disticha, —21/6—7. Paraphyses filiformes. Jodii ope sporidia adulta dilute coerulescunt.

a. Ad caules emortuas Artemisiae camp. et aliarum Compositarum in insula Csepel Danubii (Pest). 1873 Lojka sub 1992.

b. Ad caules putridas Umbelliferarum. Kaposvár (Somogy) 1871 Lojka.

58. **Lophiostoma caulium** (Fr. sub Sphaeria) De N.

cfr Cooke hdb. p. 851. Niessl in *Hedwigia* 1875 p. 21—24. *Michelia* I p. 339. Karsten myc. fenn. I p. 87.

exs: Rehm Ascomyc. 181, 484 (f. minuta).

Asci clavati, 8 spori, 105/12. Sporidia elliptica, plerumque

subobtusa, recta, 6 cellularia, 15/6, hyalina, dein fuscidula, disticha, 15/5 - 6. Paraphyses filiformes. Jod —

a. Ad ramulos siccos Ononidis spin. Szent-Miklós in insula Danubii Csepel (Pest). 1873 Lojka sub 2001.

b. Ad caules putridas Zeae Maydis prope Kaposvár (Somogy) 6/1871 Lojka.

Differt imprimis sporidiis 18 - 20/4, itaque forsitan ad aliam speciem trahenda!

59. **Lophiostoma** (*Lophiotrema*) **glaciale** Rehm nov. spec. 1879!
(? syn. *Lophiotrema* affine Spegazzini; cfr Saccardo f. it. del. 610).

exs: Rehm Ascomyc. 183 (sub ? L. Sedi Fuckel).

Perithecia c. 0,0 mm diam., primitus gregarie sub epidermide denigrata nidulantia, dein superficialia, dimidiata, hemiglobosa, in papillam pectinatam, angustam, elongatam, protracta, atra, denique foveolam albescentem, rotundam relinquentia. Asci clavato-pedicellati, apice incrassati, 8 spori, -- 120/10. Sporidia elongato-fusiformia, subcurvata, bi-cellularia, medio constricta, quaque cellula nucleo 1 magno praedita, hyalina, — 24/5, utraque apice appendice setiformi, 5 - 6 mikr. long., hyalina instructa, disticha. Paraphyses filiformes. Jod —

Ad caules putridas Aconiti in alpe Dzurova prope Teplicska (Liptó) alt. c. 5000'. 8/1872 Lojka sub 1389.

Edita in Rehm Ascomyc. 183!

60. **Lophiostoma** (*Lophiotrema*) **crenatum** (Pers. sub *Sphaeria*) Sacc. f. it. del. 359.

cfr *Michelia* IV p. 412 (? Karsten myc. fem. II p. 86).

exs: ? Fuckel f. rhen. 1808.

Asci clavati, 8 spori, c. 100/12. Sporidia elliptica, recta, medio interdum subconstricta, 2 cellularia, utraque cellula nucleis 2 magnis instricta, dein 4 - 6 cellularia, hyalina, disticha, 27/5 - 7. Paraphyses filiformes. Jod —

a. Ad ramulos *Artemisiae* camp. siccos in insula Csepel (Pest) Danubii. 1873 Lojka sub 1992.

b. A ramulos decorticatos ? Csetátye Bóli (Hunyad) Transylvaniae 1873 Lojka sub 2093.

61. **Lophiostoma** (*Lophiotrema*) **ampelinum** Rehm nov. spec. 1873.

Perithecia 0,3 mm diam., gregaria, globosa, fere plane cortici immersa, vix protuberantia nisi ostiolo pectinato, crasso, brevi, nigra,

corticis superficie denigrata. Asci cylindraceo-clavati, crassi, 8 spori, —90/8; Sporidia elongato-fusoidea, subacuta, recta, 4—8 cellularia, ad septa haud constricta, hyalina, disticha, —27/4. Paraphyses ramosae, tenerrimae. Jod —

Ad corticem trunci Vitis vinif. spontanee crescentis in sylvā Kislakensi prope Kaposvár (Somogy). 7/1871 Lojka sub 123.

62. **Lophiostoma** (Lophidium) **compressum** (Pers. sub (Sphaeria). Ces. et De N.

syn: Mytilostoma - Karsten symb. VI p. 36 (? M. deflectens et subcompressum ibid). Lophiostoma angustatum Fuckel symb. myc. p. 158. Nachtrag I p. 16. Saccardo myc. Ven. 210, f. it. del. 233. Michelia I p. 334, 310 Karsten myc. fenn. II p. 83. Grevillea VIII p. 107.

exs: Fuckel f. rhen. 924, 925. Rabh. f. eur. 340 (sub Cucurbitaria elongata). Cooke f. brit. I 661 (sub L. bicuspidata). Rehm Ascomyc. 182 a, b. Thümen myc. un. 1548, 1457. Kunze f. sel. 341. Saccardo myc. Ven. 1476.

Asci clavati, 8 spori, c. 100/15. Sporidia elliptica, obtusa, recta, 4—6 cellularia, cellulae mediae plerumque semel longitudinaliter divisae, ad septa subconstricta, fuscidula, disticha, —18/7. Paraphyses ramosae. Jod —

Ad caules siccas? Kaposvár (Somogy). 1873 Lojka sub 1995.

63. **Didymosphaeria conoidea** Niessl neue Kernpilze.

cfr Hedwigia 1875 p. 152. Saccardo f. Ven. II p. 314 obs. II, f. it. del. 208.

exs: Kunze f. sel. 326.

Asci cylindraceo-clavati, —70/6, 8 spori. Sporidia dacryoidea, obtusa, 2 cellularia, fusca, monosticha, 8/5. Paraphyses filiformes. Jod —

Ad caules putridas Aconiti Napelli infra alpem Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae alt. c. 6000'. 8/1872 Lojka.

64. **Rebentischia unicaudata** (B. et Br. sub Spaeria).

cfr Cooke hdb. p. 892. Saccardo consp. p. 12.

exs: Rabh. f. eur. 50. Rehm Ascomyc. 241.

Asci clavati, crassi, 8 spori, 60/15. Sporidia oblonga, obtusa, 4 cellularia, ad septa haud constricta, quaque cellula nucleo 1 magno praedita, —21/6; apice una appendiculo hyalino, setiformi, 2 cellulari, c. 6 mikr. long. instructa, fuscidula, disticha. Paraphyses ramosae. Jod —

Ad corticem Clematidis Vitalbae in valle „Riu mare“ infra alpem Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1873 Lojka.

Edita in Rehm Ascomyc.!

65. **Pleospora vulgaris** Niessl Notizen p. 27.

cfr Saccardo in Michelia I p. 48, f. it. del. 549.

exs: Rabh. f. eur. 451, 824, 1332. Saccardo myc. Ven. 1349
(sub Pl. media).

Exemplar mancum sporidiis transverse 4--8 cellularibus, nonnullis cellulis semel longitudinaliter divisis, —24/7 huc pertinere videtur.

Ad caules Compositae siccas. Kaposvár (Somogy) Lojka sub 195.

66. **Pleospora coronata** Niessl Notizen p. 16 tab. IV f. 2.

exs: Rehm Ascomyc. 591.

Asci crassi, clavati, (4—) 8 spori, —105/15. Sporidia ovoideo-elongata vel elliptica, recta vel subcurvata, in 2—8 cellulas transverse septata, cellulis mediis plerumque semel longitudinaliter divisis, mellea, disticha, —30/8; senilia saepe una apice breviter appendiculata. Paraphyses ramosae, guttulae. Ad basim perithecii hyphae nonnullae fuscae, breves. Jodii ope sporidia coerulescunt.

a. Ad caules siccas Centaureae Tauscheri in terra arenosa „Buczka“ prope Szent-Miklós in Insula Danubii Csepel (Pest). 6/1873 Lojka sub 1991.

b. ad caules siccas Artemisiae camp. ibidem. 1873 Lojka sub 1992.

c. ibidem 1873 sub 1995.

d. ad caules putridas Aconiti in alpe Retyezát (Hunyad) c. 6000' alt. Transsylvaniae. 8/1873 Lojka. Sporidia transverse 10 cellularia. Mihi dubium, an speciminulum meum huc trahendum sit!

67. **Leptosphaeria scotophila** Sacc. f. Ven. II p. 317.

cfr Michelia I p. 342. Sacc. f. it. del. 282.

Asci cylindraneo-clavati, apice incrassati, 8 spori. Sporidia elliptica, 4 cellularia, ad septa subconstricta, fere hyalina, plerumque monosticha, 21/—7. Paraphyses ramosae. Jod —

Ad caulem siccam Umbelliferae. Lipócz (Sáros) Lojka sub 640. Speciminulum ad hanc speciem pertinere videtur!

68. **Leptosphaeria rubicunda** Rehm nov. spec.

cfr Winter in Flora 1872 p. 543. Saccardo f. Ven. II p. 315, f. it. del. 292.

exs: Rehm Ascomyc. 92.

Perithecia gregaria, in maculis rubris epidermidis immersa, minuta, globosa, in collum brevem attenuata, atra. Asci clavati, 8 spori, 60/9. Sporidia fusioidea, recta vel subcurvata, 4 cellularia,

cellula secunda plerumque latiori, ad septa subconstricta, dilute flavidula, 2 -- 3 sticha, — 27/3. Paraphyses ramosae, articolatae. Jod —

Ad caules putridas Conii maculati in horto Eszterházyano. Kaposvár (Somogy) 1871 Lojka.

Edita in Rehm Ascomyc.

69. **Leptosphaeria purpurea** Rehm nov. spec.

Perithecia gregaria, primitus epidermide tecta, dein ea secedente libera, in ligni longe lateque purpuree tincti superficie insidentia, hemisphaerica, integra, papilla minutissima pertusa, glabra, atra, c. 0,3 mm diam., hyphis creberrimis, longiusculis, fuscis, c. 0,3 mikr. diam. basi insidentibus. Asci clavati, 8 spori, 70/8. Sporidia fusioideo-elongata, plerumque recta, 4 cellularia, cellula secunda multo latiori, cellulis nucleo 1 magno praeditis, mellea, 21/3—3,5, disticha. Paraphyses ramosae. Jod —

Ad caules siccas Artemisiae vulgaris in horto Eszterházyano. Kaposvár (Somogy). 1871 Lojka.

70. **Leptosphaeria obesa** (Dur. et Montagne sub Sphaeria) Saccardo in Michelia I p. 38.

syn: Heptameria elegans Thümen 1879 in herb. meo.

cfr Saccardo f. it. del. 284.

Asci clavati, 8 spori, 75/15. Sporidia fusioidea, recta vel subcurvata, acutata, cellula media magna, c. 9 mikr. lg., nucleo 1 magno centrali praedita, latiore caeteris cellulis cujusque lateris 4, ita ut sporidia 9 cellularia sint, cellula media fusca, lateralibus fuscidulis, 42/5, disticha. Paraphyses ramosae. Jod —

Ad caules siccas Artemisiae camp. in horto Eszterházyano Kaposvár (Somogy). 7/1871 Lojka.

Species, quoad sporidia egregia!

71. **Leptosphaeria modesta** (Desm.) Awd.

syn: L. Cibostii Ces. et De N., setosa Niessl, Passerinii Sacc. cfr Karsten myc. fem. II p. 106. Cooke hdb. p. 905 (sub Sphaeria). Saccardo in Michelia I p. 37, 343, 511, 494, f. it. del. 521, 291 (Passerini).

exs: Kunze f. sel. 74, 257 (?). Rabh. f. eur. 948. Saccardo myc. Ven. 1352. Fuckel f. rhen. 2439 (sub Pleospora Phyteumatis symb. myc. Nachtrag II p. 25). Thümen f. austr. 484, 1253, ? 483, myc. un. ? 165 (non Fuckel f. rhen. 856).

f. Aconiti.

Sporidia fusiformia, obtusa, recta vel subcurvata, 5 cellularia, cellula secunda ceteris latiori, flavidula, — 30,5, 2—3 sticha in

ascis clavatis 90/14 Paraphyses ramosae. Jodii ope sporidia coeruleo-
rulescunt.

Ad caules siccas *Aconiti Napelli* in alpe Retyezát, alt. c 6000'.
(Hunyad) Transsylvaniae. 8/1872 leg. Lojka.

72. **Leptosphaeria macrospora** (Fuckel symb. myc. p. 138
sub Pleospora) Thümen.

syn: *L. pyrenopezizoides* Speg. et Sacc. cfr Sacc. f. it. del. 323.

exs: Thümen myc. un. 1359. Sacc. myc. Ven. 1475.

Asci clavati, 8 spori, 105/12. Sporidia oblonga, obtusa, sub-
curvata, 4 cellularia, cellula secunda ceteris latiore, flavidula, —30/5.
Paraphyses filiformes.

Ad caules Umbelliferarum putridas prope Kaposvár (Somogy).
Lojka.

Videtur haud diversa a *L. Nitschkei* Rehm Ascomyc.

73. **Leptosphaeria Doliolum** (Pers. sub Sphaeria) Ces. et De N.

syn: Pleospora—Fuckel symb. myc. p. 135.

cfr Cooke hdb. p. 902. Saccardo myc. Ven. p. 103; f. Ven.
II 314, f. it. del. 499. Karsten myc. fenn. II p. 97. *Michelia* I
p. 318. *Revue myc.* 11 p. 44.

exs: Rehm Ascomyc. 93 *a, b*. Saccardo myc. Ven. 1350,
1472. Moug. et Nestler stirp. vog. 571. Plowright sphaer. brit. II
79. Cooke f. brit. II 495. Ellis n. am. f. 197. (? Fuckel f. rhen.
901. Rabh. hb. myc. II 545. bad. crypt. 635. Cooke f. brit. I 489.
Thümen f. austr. 1255). non Rabh. f. eur. 1546 (*Ophiobolus*).

Asci cylindranei, crassi, 8 spori, —130/6. Sporidia fusoido-
elliptica, (4 raro 6—) cellularia, recta vel subcurvata; cellula
media plerumque latiore, saepe quaque cellula nucleo 1 magno
praedita, interdum ad septa subconstricta, mellea, 1½ sticha, —25/5.
Paraphyses ramosae. Jod —

a. Ad caules siccas *Urticae dioicae* in horto Eszterházyano.
Kaposvár (Somogy) 7/1871 Lojka.

Edita in Rehm Ascomyc. 93 *a*.

b. ibidem ad caules putridas Umbelliferarum 8/1871 Lojka.

Edita in Rehm Ascomyc. 93 *b*.

c. ibidem ad caules siccas *Daturae Stramonii*. 1871 Lojka
sub 117 *a*.

d. ibidem ad caulem siccam. 1872 Lojka sub 81.

f. *syndoliola* Rehm.

Sporidia 4 (rarissime 6) cellularia, 18—21/3,5—5. Perithecia
minuta, extus non rugosa.

a. ad caules putridas Conii in horto Eszterházyano. Kaposvár (Somogy) 1871 Lojka sub 40.

Forsitan minutie peritheciolorum et sporidiorum revera diversa species!

b. ad caules siccas Peucedani longifolii prope „Kreuz“ supra Thermas Herculis in Hung. 9/1872 Lojka sub 2008.

(extus formae normali similis!)

f. conoidea De N.

cfr Cooke hdb. p. 902. Saccardo f. Ven. nov. II p. 314, f. ii. del. 500. Karsten myc. fenn. II p. 98.

exs: Rehm Ascomyc. 194, 343. Saccardo myc. Ven. 76. Kunze f. sel. 335, 336.

Asci cylindracei, apice incrassati, 8 spori, — 90/6. Sporidia fusoido-elliptica, recta vel subcurvata, saepe altera cellula media latiori, 4 cellularia, quaque cellula plerumque nucleo magno 1 centrali instructa, mellea, ad septa subconstricta, 1½ sticha, — 18/4 Paraphyses ramosae. Jod —

a. Ad caules siccas Dipsaci sylvestris prope Lunkany in Hung. 7/1872 Lojka.

Edita in Rehm Ascomyc. 194!

b. Ad caules siccas Angelicae sylv. in monte Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1873 Lojka.

74. **Leptosphaeria Coniothyrium** (Fuckel symb. myc. p. 115. Nachtrag II p. 89 sub Sphaeria). Saccardo f. Ven. II p. 317, V p. 200.

cfr Saccardo myc. Ven. 98 tab. IX f. 47—49, f. it. del. 517.

exs: Rehm Ascomyc. 388. Fuckel f. rhen. 2521 (? 910 sub Sphaeria clypeiformis).

Asci clavati, 8 spori, — 66/7. Sporidia fusoida vel elliptica, recta vel subcurvata, 4 cellularia, ad septa subconstricta, fuscidula, 10/3, 1½ sticha. Paraphyses filiformes. Jod —

Ad sarmenta sicca Rubi Jdaci infra Theu ursului prope Lunkány in Hung. 7/1872 Lojka sub 1883.

75. **Leptosphaeria agnita** (Desm. sub Sphaeria) Ces. et De N.

syn: Pleospora—Fuckel symb. myc. p. 135.

cfr Cooke hdb p. 903. Sacc. f. Ven. nov. II 316, f. it. del. 506. Winter in Flora 1872 p. 523.

exs: Rabh. f. eur. 826, 1254, 2042, 1138 (sub Pleospora herbarum). Cooke f. brit. II 255. Thümen myc. un. 1257, f. austr. 861 (sub Rhabdiphora Betonicae). Rehm Ascomyc. 35, 144. (? Fuckel f. rhen. 888).

Asci clavati, 8 spori, 90/10. Sporidia dactyloidea, prope medium constricta, 7 cellularia, plerumque quaque cellula nucleo 1 magno praedita, recta vel subcurvata, obtusa, flavidula, disticha. 36/5. Paraphyses ramosae. Jod —

Ad caules siccas Centaureae Tauscheri (Kerner) in terra arenosa „Buczka“ prope Szent-Miklós insulae Danubii Csepel (Pest). 6/1873 Lojka sub 1991.

76. **Massaria polymorpha** Rehm nov. spec. 1880.

Perithecia minuta, globosa, c. 0,5 mm diam., sub epidermide pro parte infuscata in cortice interiore nidulantia eamque pustulatum gregarie elevantia et radiatum findentia, atra, ostiolo minuto pertusa. Asci clavati, apice incrassati, 8 spori, —1!0/12. Sporidia obtuse elliptica, medio subconstricta, 2 cellularia, utraque cellula nucleis 2 magnis praedita, massa gelatinosa lata circumdata, hyalina, —24/5, 1—1½ sticha. Paraphyses ramosae. Jod —
exs: Rehm Ascomyc. 242 (sub Sphaeria intermixta).

Ad ramos siccos Rosarum infra alpem Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae. Lojka.

Edita in Rehm Ascomyc. 242!

77. **Massaria inquinans** (Tode sub Sphaeria) Fr. S. Veg.

cfr Karsten myc. fenn. II p. 82. Saccardo myc. Ven. p. 109 tab. X f. it. del. 413, 414. Fuckel symb. myc. p. 153. Cooke hdb. p. 846.

exs: Fuckel f. rhen. 803. Rabh. f. eur. 1237, 1526. Saccardo myc. Ven. 82, 1189 (? Plowright sphaer. brit. II 48).

Exemplaria senilia, sine ascis, sporidiis specificè tetrablastis, fuscis, 57—60/15.

Ad ramulos siccos Aceris camp. Kaposvár. Lojka 1872 sub 154.

78. **Rosselinia minima** Fuckel symb. myc. p. 149.

Asci cylindracei, 8 spori, 60/5. Sporidia elliptica, 1 cellularia, nucleo 1 centrali magno praedita, fusca, monosticha, 9/4. Paraphyses? Jod —

Ad sarmenta putrida Sedi Telephii prope Kaposvár (Somogy). 1871 Lojka sub 143.

Dubitandum, an exemplaria revera ad hanc speciem pertineant!

79. **Rosselinia Aquila** (Fr. sub Sphaeria) Tul. De N.

syn: Sphaeria byssiseda Engl. fl.

cfr Fuckel symb. myc. p. 148. Saccardo myc. Ven. p. 108. f. Ven. II p. 32, f. it. del. 586. Michelia I p. 26. Cooke hdb. p. 853.

exs: Fuckel f. rhen. 963, 964, 1061 (sub *Hypoxylon globulariforme*). Rabh. hb. myc. II 648, f. eur. 1016. Moug. et Nestler stirp. vog. 965. Cooke f. brit. II 486. Plowright sphaer. brit. I 61. Ravenel f. amer. 365. Ellis n. am. f. 181. (? Sacc. myc. Ven. 1366) non Sacc. myc. Ven. 1488.

Asci cylindracei, 8 spori, 135/—7. Sporidia elliptica, 1 cellularia, nucleis 1—2 magnis instructa et massa gelatinosa tenui involuta, fusca, monosticha, 15—18/5. Paraphyses articulatae, guttulate. Jodii ope apex ascorum valde coerulescit.

a. Ad ramum putridum. Kaposvár (Somogy) 1872 Lojka sub 51.

b. Ad sarmenta putrida *Vitis viniferae*. Kaposvár (Somogy) 5/1871 Lojka.

80. **Lasiosphaeria Racodium** (Pers. sub *Sphaeria*) Ces. et De N. syn: *L. hirsuta* (Fr. sub *Sphaeria*) Fuckel symb. myc. p. 147. cfr Karsten myc. fenn. II p. 161. Fuckel symb. myc. p. 147. Cooke hdb. p. 854. Saccardo f. it. del. 587.

exs: Fuckel f. rhen. 950, 951. Saccardo myc. Ven. 779. Plowright sphaer. brit. II 53 (sub *Sph. hirsuta*). (? Rabh. hb. myc. II 649. f. eur. 829).

Speciminulum mancum! Asci clavati, 8 spori. Sporidia dactyloidea, obtusa, inferiore tertia parte subcurvata, 1 cellularia, plurinucleata, hyalina. 50/—5.

Ad lignum salicis. Kaposvár Lojka 1872 sub 200.

81. **Lasiosphaeria hispida** (Tode sub *Sphaeria*) Fuckel symb. myc. p. 147. f. *terrestris* (Sow.). Thümen.

cfr Saccardo f. it. del. 558. Cooke hdb. p. 855, 857.

exs: Fuckel f. rhen. 949 (? 2039 f. *terrestris*), Thümen myc. un. 1745 (? 1744 sub *L. terrestris* Thümen), ubi cit. syn.: *L. hispida* Fuckel symb. myc. p. 147 p. p. *Sphaeria biformis* Pers. syn. fung. p. 56 p. p. *Sphaeria terrestris* Sow. f. tab. 373 f. 7.)

Asci clavati, 8 spori. Sporidia dactyloidea, apice superiore obtusa. inferiore acutata; inferiore tertia parte obtusangule curvata, 1 cellularia, nucleis quatuor magnis instructa, hyalina, disticha, 45/5. Pili simplices, septati, fusci, c. 4 mikr. crass.

Ad terram sylvae Kislakensis prope Kaposvár (Somogy). 1871 Lojka sub 198.

82. **Leptospora ovina** (Pers. sub *Sphaeria*) Ces. et De N.

syn: *Lasiosphaeria*—Karsten myc. fenn. II p. 164.

cfr Fuckel symb. myc. p. 143. Cooke hdb. p. 856. Saccardo f. it. del. 559. Michelia I p. 45

exs: Rabh. hb. myc. II 730 (? f. eur. 1444). Fuckel f. rhen. 788. Thümen myc. un. 968. Plowright sphaer. brit. II 51 (? Cooke f. brit. II 565, 576).

Asci clavati, 8 spori. Sporidia cylindrica, obtusa, subcurvata, 1 cellularia, nucleis 2 magnis praedita, hyalina, disticha, 36/5. Paraphyses filiformes. Jod —

Ad truncum putridum in sylva Kislakensis prope Kaposvár (Somogy) in Hung. Lojka 1872 sub 205.

83. **Enchnosphaeria Pinetorum** Fuckel symb. myc. p. 147.

syn: Sphaeria scabra Curr.

cfr Cooke hdb. p. 859. Winter in Flora 1872 p. 510.

exs: Rehm Ascomyc. 43 (sub *Bertia querceti* Rehm), 90. Fuckel f. rhen. 1797. Rabh. f. eur. 1245 (sub *Lasiosphaeria scabra* Awd).

Asci clavati, 8 spori, 80, 12. Sporidia fusioidea, obtusa, recta, medio constricta, 2 cellularia, quaque cellula nucleis 2 magnis praedita, hyalina, (interdum utraque apice breviter hyaline appendiculata), —30, 6, disticha. Paraphyses filiformes. Jod —

Ad basim peritheiorum hyphae fuscae, c. 4 mikr. crassae.

Ad caules putridas Aconiti alpici Dzurowa prope Teplicska (Liptó), alt. c. 5000'. 8/1872 Lojka.

Verisimiliter exemplaria ad hanc speciem trahenda puto!

84. **Ciypeosphaeria Notarisii** Fuckel symb. myc. p. 117. Nachtrag III p. 19.

syn: Sphaeria clypeiformis De N. (? *Sph. mamillana* Fr.) non = *Sph. Notarisii* Car.

cfr Saccardo f. it. del. 189. *Michelia* I p. 39. II p. 65. Cooke hdb. p. 889 (sub *Sph. clypeata* Nees).

exs: Fuckel f. rhen. 1823 (sub *Sordaria clypeata*). Saccardo myc. Ven. 1159. Plowright sphaer. brit. I 85, III 57. (? Rabh. hb. myc. II 645).

Asci cylindracei, 8 spori, 150 8. Sporidia cylindracea, obtusa, 4 cellularia, plerumque quaque cellula 1—3 nucleis praedita, demum ad septa subconstricta, fusca, monosticha —24, 6, 5. Paraphyses filiformes. Jodii ope apex ascorum coeruleoescit.

Ad ramum siccum Rosae in valle Kolezvárensi (Hunyad) Transylvaniae. 8/1873 Lojka.

85. **Sphaerella superflua** (Awd sub *Sphaeria*) Fuckel symb. myc. p. 102.

cfr Cooke hdb. p. 907. Karsten myc. fenn. II p. 177.

exs: Fuckel f. rhen. 884. Plowright sphaer. brit. II 83 (? Kunze f. sel. 258 sub *Didymosphaeria*—Niessl).

Asci clavati, 8 spori. Sporidia oblongo-elliptica, subobtusa, recta vel subcurvata, 2 cellularia, hyalina, disticha, 15/4. Paraphyses desunt. Jod —

Ad caules putridas Umbelliferarum in alpe Retyezát (Hunjad) Transsylvaniae. 1873 Lojka.

86. **Ophiobolus rubellus** (Pers. sub *Sphaeria*) Rehm.

syn: *Rhaphidophora*—Fuckel symb. myc. p. 125.

cfr Karsten myc. fenn. II p. 165. Cooke hdb. p. 899. Saccardo myc. Ven. p. 101. *Michelia* II p. 67.

exs: Fuckel f. rhen. 787 (sub *Leptospora*). Rabh. f. eur. 1546 (sub *Pleospora Doliolum*), 1555 (sub *Rh. erythrospora* Oud.) (? hb. myc. II 532). Plowright sphaer. brit. II 77. Thümen myc. un. 561. Saccardo myc. Ven. 920. Kunze f. sel. 79, 254. Cooke f. brit. II 688. Ellis f. n. amer. 191. Rehm *Ascomyc.* 94.

Asci cylindracei, apice incrassati, 8 spori, 180/—5. Sporidia filiformia, multiseptata, flavidula, recta, parallela, 180/1,5. Paraphyses ramosae. Jod —

a. Ad caules putridas Umbelliferarum in horto Eszterházyano. Kaposvár (Somogy). 5/1871 Lojka.

Edita in Rehm *Ascomyc.* 94!

b. Ibidem ad ramulos putridos Sambuci Ebuli. 5/1871 Lojka.

c. Ad caules putridas *Kitaibeliae vitifoliae*. Ercsi (Fehér) in Hungaria. 9/1873 Lojka sub 2124.

d. Ad caules putridas *Amaranthi*. Lojka 1871 sub 201.

87. **Ophiobolus Fruticum** (Rob. sub *Sphaeria*) Rehm.

syn: *Rhaphidophora*—Fuckel symb. myc. p. 125. *Rh. Ononidis* Awd.

exs: Fuckel f. rhen. 779. Kunze f. sel. 80. Rehm *Ascomyc.* 140. Rabh. f. eur. 1256) (? 359). Thümen myc. un. 61 (? f. austr. 249).

Asci cylindraceo-clavati, apice incrassati, 8 spori, 120/12. Sporidia filiformia, subacuta, —20 cellularia, flavidula, vermicularia, —120/4—5, circumvoluta. Paraphyses ramosae. Jod —

Ad ramulos siccos *Ononidis spinosae*. Szent-Miklós in insula Csepel Danubii (Pest). 6/1873 Lojka sub 2001.

88. **Ophiobolus compressus** Rehm.

Perithecia dimidiata, nigra, hemisphaerico-conica, primitus sub epidermide nidulantia, dein sessilia, sicca compressa, seriatim aggregata, c. 0,5 mm diam, minutissime papillata poroque vix per-

spicuo instructa, sicca utrimque compressa. Asci cylindraceo-clavati, 8 spori, 110/15. Sporidia filiformia, subacuta, medio subconstricta, 8—16 cellularia, cellulis nucleatis, flavescentia, parallela, 90/4. Paraphyses ramosae. Jod —

exs: Rehm *Ascomyc.* 189 (sub *Rhaphidophora*).

Ad caules emortuas *Artemisiae* camp. prope Szent-Miklós in insula Danubii Csepel (Pest). 6/1873 Lojka sub 1992.

Edita in Rehm *Ascomyc!*

89. **Ophiobolus Bardanae** (Wallr. sub *Sphaeria*) Rehm.

syn: *Rhaphidophora*—Fuekel *ymb. myc.* p. 126.

exs: ? Fuekel f. rhen. 886 et Thümen f. austr. 475.

Asci cylindraceo-clavati, 8 spori, 120/9. Sporidia filiformia, multicellularia, subcurvata, circumvoluta, 90/—3; (hinc inde cellula una media sublatiore).

a. Ad caules putridas *Angelicae* sylv. infra alpem Retyezát (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1873 Lojka.

b. Ad caules putridas *Conii* prope Kaposvár (Somogy). 1871 Lojka.

Nescio an exemplaria revera ad hanc speciem, mihi ipsa plane dubiam et forsitan ad *Ophiobolus acuminatum* ducendam, pertineant.

90. **Sordaria fimicola** (Rob. et. Desm. sub *Sphaeria*) Ces. et De N.

syn: *Hypocopra fimeti* b. equina Fuekel *ymb. myc.* p. 241.

Sordaria conferta Awd man. sec. Winter. *Massaria fimeti* Cooke hdb. p. 847; non *Ixodopsis*—Karsten *myc. fenn.* II p. 50.

cfr Winter *Sordarien* p. 17 tab. VII f. 6 a—f. Niessl in *Hedwigia* 1873 p. 131 (non *Michelia* p. 221).

exs: Fuekel f. rhen. 1802 (? 1001). Saccardo *myc. Ven.* 1181.

Cooke f. brit. II 566 (? Kunze f. sel. 101). Rabh. hb. *myc.* II 433, f. eur. 644, 830.

Asci cylindracei, 8 spori. Sporidia elliptica, 1 cellularia, nucleo 1 magno centrali praedita, fusca, monosticha, 18—27/—10.

Ad sterces equinum in alpe Kralowa Hola (Liptó). 9/1872 Lojka sub 1867 A.

Exemplaria vetusta quoad ascos et sporidia!

91. **Sordaria bombardioides** Awd.

cfr Winter *Sord.* p. 22 tab. VIII f. 11. Niessl *Beiträge in Hedwigia* 1873 p. 130.

Asci cylindracei, 8 spori. Sporidia obtuse elliptica, 1 cellularia, nucleo magno 1 centrali praedita, fusca, massa gelatinosa tenui involuta, monosticha, —24/9. Paraphyses ramosae. Jod —

Ad sterces leporinum. in sylva Toponárensi prope Kaposvár (Somogy) in Hung. 1872 Lojka sub 168.

92. **Sordaria minuta** Fuckel symb. myc. Nachtrag II p. 44.
syn: *S. tetraspora* Winter in Hedwigia 1871 p. 161. (? *S. coprophila* Fuckel symb. myc. p. 244).

exs: Rehm Ascomyc. 199. (? Rabh. f. eur. 1529 sub *S. tetraspora*).

Asci clavati, 8 spori. Sporidia ovata, 1 cellularia, nucleo 1 magno centrali praedita, fusca, altera apice in papillam hyalinam, altera in appendicem — 30 mikr. long., 5 lat., hyalinam abeuntia, — 17/9, disticha.

a. ad sterces vaccinum prope Lunkány in Hung. 7/1872 Lojka sub 1890.

b. ibidem. Malomviz (Hunyad) Transsylvaniae. 1872 Lojka sub 1877.

Mihi dubium, an exemplaria ad speciem nominatam pertinent!

93. **Sordaria fimiseda** Ces. et De N.

syn: *Cercophora* — Fuckel symb. myc. p. 245. Nachtrag II p. 326. *Sphaeria lanuginosa* Preuss. Arnium—Nke.

cfr Winter Sord. p. 25. tab. IX f. 13. *Michelia* I p. 226. Karsten myc. fenn. II p. 52.

exs: Rehm Ascomyc. 235 (non Fuckel f. rhen. 2037 = *Sordaria curvula* De By).

Asci elliptico-clavati, crassi, — 330/50, 8 spori. Sporidia elliptica vel ovoidea, primitus hyalina, dein fusca, 1 cellularia, nucleo 1 magno centrali praedita, 42 - 50/--27; altera apice appendiculo hyalino, striatulo, curvato, basi — 15 lat., long. 90 mikr., altera recto, c. 30/9 instructa, 1---2 sticha. Paraphyses ramosae. Jod —

Pili apicis perithecii breves, septati, fusci, c. 4 mikr. crassi.

Ad fimum vaccinum prope Lunkány et Fácset in Hungaria. 7/1872 Lojka sub 1890 et 1891.

Edita in Rehm Ascomyc!

94. **Sordaria decipiens** Winter.

cfr Fuckel symb. myc. Nachtrag II p. 44 f. 33. *Michelia* I p. 226.

Asci elliptico-clavati, 145 long., 8 spori. Sporidia ovoidea, 1 cellularia, nucleo centrali 1 magno praedita, fusca, 30/15; altera apice acutata appendiculo hyalino, striatulo 12/9, altera apice truncata appendiculo filiformi, hyalino, c. 45 long., recto instructa.

Ad fimum vaccinum prope Lunkány in Hungaria. 7/1872 Lojka sub 1889 et 1890.

95. **Sordaria curvula** De By.

syn: Sphaeria fimiseda De N. Cercophora conica Fuckel symb. myc. p. 245. Sordaria breviseta Karsten myc. fenn. I p. 52. Malinvernia breviseta Fuckel symb. myc. p. 243. Schizothecium fimiculum Cda. Sordaria appendiculata Awd. (non Ixidopsis fimicola (Rob. sub Sphaeria) Karsten myc. fenn. I p. 50. nec Cercophora fimiseda Fuckel symb. myc. p. 245).

cfr Winter Sordarien p. 37. tab. XI f. 22 cum f. coronata et aloides Winter (syn: Sordaria—Fuckel symb. myc. Nachtrag II p. 43). Hedwigia 1873 p. 161, 1874 p. 54. Grevillea IV p. 113. Michelia II p. 26, 225.

exs: Kunze f. sel. 102. Fuckel f. rhen. 2037. Saccardo myc. Ven. 1182. Plowright sphaer. brit. III 43. Rehm Ascomyc. 138, 200 (f. juvenilis). (? Cooke f. brit. II 682. Thümen f. austr. 1152. Fuckel f. rhen. 2549, 1002).

Asci elliptico-clavati, 8 spori, 120/21. Sporidia elliptica, fusca, 1 cellularia, nucleo centrali 1 magno instructa, altera apice in papillam hyalinam protracta, altera filiformiter, hyaline, 18/3 appendiculata, c. 27.12 (sine appendiculis!) disticha. Paraphyses ramosae. Jod —

a. Ad fimum vaccinum prope Lunkány in Hungaria. 1872 Lojka sub 1890.

b. ibidem in Galicia australi. 8/1 69 Lojka.

96. **Sordaria coprophila** (Fr. syst. sub Sphaeria) Ces. et De N. syn: Hypoxylon — Fr. S. Veg. Cercophora mirabilis Fuckel symb. myc. p. 245.

cfr Winter Sordarien p. 26 tab. IX f. 14. Karsten myc. fenn. I p. 51. Michelia II p. 227. Cooke hdb. p. 866. Hedwigia 15 tab. 13.

exs: Fuckel f. rhen. 1057, 2271. Rabh. hb. myc. II 257. Spegazzini dec. it. 43 (? Rabh. f. eur. 830. Ellis n. am. f. 499. Sacc. myc. Ven. 1492). Rehm Ascomyc. 198, 234 (inevoluta!).

Sporidia cylindrica ut in Lasiosphaeria et tertia inferiore parte obtusangule curvata, 1 cellularia, nucleis 2 magnis praedita, hyalina, c. 42/6, 8 disticha et convoluta in ascis clavatis, apice in-crassatis, c. 150/8. Paraphyses articulatae.

Exemplaria adhuc juvenilia, inevoluta!

a. Ad fimum vaccinum prope Fácset in Hung. 7/1872 Lojka.

b. ibidem prope Malomviz (Hunyad) Transsylvaniae. 8/1872
Lojka.

Edita in Rehm Ascomyc. 234!

97. **Sporormia minima** Awd in Hedwigia 1868 p. 66.

cfr Fuckel symb. myc. p. 242. Karsten myc. fenn. I p. 110.
Michelia III p. 230. Hedwigia 1878 p. 146. Grevillea VIII
p. 108.

exs: Fuckel f. rhen. 997 p. p. (sub *Sph. fimetaria*). Moug. et
Nestler stirp. vog. 1169 (sub *Sphaeria stercoris*). Rabh. f. eur. 1339
a, b. Cooke f. brit. I 451, II 567 (?). Thümen f. austr. 1055. Kunze
f. sel. 167 (sub *Sp. intermedia*). Saccardo myc. Ven. 1183, 1184,
1362 (?). Ellis n. am. f. 198. Rehm Ascomyc. 34.

Asci cylindraceo-clavati, 8 spori, 60/12. Sporidia oblonga, ob-
tusa, 4 celluria, 24/4, in 4 partes mox secedentia, mucore gela-
tinosa tenui circumdata, disticha. Paraphyses? Jod —

Ad fimum vaccinum. Gelsendorf (Stryj) in Galicia australi.
Lojka.

98. **Sporormia intermedia** Awd in Hedwigia 1868 p. 66.

cfr Fuckel symb. myc. p. 242. Cooke hdb. p. 866. Michelia
p. 230. Karsten myc. fenn. II p. 110. Hedwigia 1878 p. 146. (syn?
f. *grandispora* Spegazz. in Michelia I p. 230).

exs: Fuckel f. rhen. 997. p. p. Rehm Ascomyc. 134 (non
Fuckel 903, Rabh. eur. 644).

Asci clavati, 8 spori, 150/30. Sporidia oblonga, 4 cellularia,
48.9--10, mox in partes quatuor secedentia, fusca, disticha, mucore
gelatinosa tenui circumdata. Paraphyses articulatae. Jod —

Ad fimum vaccinum in sylva Holobutowensi prope Brigidau
(Sambor) Galiciae australis. 9/1869 Lojka.

99. **Sphaerotheca Castagnei** Lev. Fuckel symb. myc. p. 78.
f. *Aconiti*.

Ascus 1 in Peridio. Sporidia plane involuta.

Ad caules putridas *Aconiti Napelli* infra alpem Retyezát (Hu-
nyad) Transsylvaniae, alt. c. 6000'. 8/1873 Lojka.

100. **Perisporium vulgare** Corda.

syn: *Preussia funiculata* (Preuss sub *Perisporium*) Fuckel
symb. myc. p. 91. *Sporormia Fleischhackii* Awd. *Perisporium laeve*
Awd. (cfr Karsten myc. fenn. I p. 109). *Preussia Kunzei* Fuckel
symb. myc. Nachtrag II p. 18. *Perisporium Typharum* Sacc. myc.
Ven. p. 92.

cfr Sacc. f. Ven. V p. 174. Michelia p. 401. Cooke hdb. p.

644. Saccardo f. it. del. 597—599. Hedwigia 1865 no 5 tab. I no 2, 1869 no 1 p. 2.

exs: Rabh. f. eur. 921, 1338, 1433. Fuckel f. rhen. 1750. Thümen myc. un. 161. Cooke f. brit. I 699 (f. telae).

Asci ovales, crassi, 8 spori. Sporidia oblonga, 4 cellularia, articulata et mox in partes quatuor soluta, parallela, 27/6, fusca.

Paraphyses ramosae. Jod —

Ad lignum quercinum fabrefactum. Kaposvár (Somogy) 1872. Lojka sub 29.

Addenda.*)

101. *Lasiosphaeria canescens* (Pers. sub *Sphaeria*) Karsten myc. fenn. II p. 162.

cfr Cooke hdb. p. 858 (descriptio sporarum haud plane quadrat).

Ad lignum tecti. Árva-Varálja. in Hungaria. Lojka.


Ad 82: *Leptospora ovina* (Pers).

Ad ramum siccum Sambuci racemosae in valle „Ticha dolina“ (Liptó) Tátra Hung. Lojka sub 4273.

*) Aegre fero, me permulta, quae ad species supra descriptas addenda et in descriptione data corrigenda erant, nunc, quia hoc demum anno in lucem prodierunt, omittere coactum esse.



Index Specierum et Synonymorum.



<i>Acclinis</i> (Fr.)	38	<i>brevisetata</i> Fuck	63
<i>acerina</i> Fuck.	45	<i>brevisetata</i> Karst.	63
Aconiti Rehm	12	<i>Bulliardii</i> Tul.	33
Actinothyrium Fuck.	26	<i>byssina</i> Fuck.	12
<i>acuminatum</i> (Fr.)	27	<i>byssiseda</i> Engl. Fl.	57
affine Speg.	51		
<i>agnita</i> (Desm.)	56	<i>Cacaliae</i> Pers.	5
Ailanthi Rehm	40	<i>Cacaliae</i> Sacc.	7
<i>albidula</i> Hedw.	5	<i>callosa</i> Bull.	14
<i>albipes</i> Fuck.	29	<i>calycina</i> (Schum.)	8
<i>alpina</i> Hazsl. (Didymosph.)	48	<i>canescens</i> (Pers.)	65
<i>alpina</i> Hazsl. (Phacidiops.)	28	<i>Carestiae</i> (De N.)	27
<i>ampelina</i> (Nke)	36	<i>caricinum</i> Rob.	26
<i>ampelina</i> Pass.	15	<i>carnea</i> Fuck.	44
ampelinum Rhm	51	<i>carneus</i> (Pers.)	29
<i>amphiboloides</i> Nyl.	21	<i>Castagnei</i> Lev.	64
<i>angustatum</i> Fuck.	52	<i>Catillus</i> Sacc.	48
<i>appendiculata</i> Awd	63	<i>Caulium</i> (Fr.)	50
<i>appendiculatum</i> Niessl	50	<i>Caulium</i> Fuck.	50
<i>apiculatum</i> Fr.	26	<i>Cerasi</i> (Pers.)	21
<i>arnndinaceum</i> (Schrad.)	26	<i>cerea</i> (Sow)	3
<i>Aquila</i> (Fr.)	57	<i>cervina</i> Pers.	30
<i>Aspegrenii</i> (Fr.)	48	<i>Chailetii</i> Pers	22
<i>aspera</i> Fr	36	<i>chlorella</i> (Fr)	42
<i>aspera</i> (Nitschke)	36	<i>chrysophthalma</i> (Pers.)	8
<i>atrata</i> (Hedw.)	18	<i>Cibostii</i> Ces	54
<i>Atropae</i> Pers.	11	<i>ciliatus</i> Schmitt	30
<i>aurea</i> Tul.	16	<i>cincta</i> (Fr.)	37
		<i>cinerea</i> (Batsch.)	14
<i>Bardanae</i> (Wallr.)	61	<i>cinnabarina</i> (Tode et Fr.)	43
<i>Berengeriana</i> Sacc.	35	<i>citrinum</i> (Hedw.)	4
<i>bombardioides</i> Awd.	61	<i>clypeiformis</i> DN.	59

<i>coccinea</i> (Jacq.)	4	<i>finicola</i> (Rob. et Desm.)	61
<i>coccinella</i> Sommf.	17	<i>fimiculum</i> Corda	63
coerulescens Rehm	9	<i>finiseda</i> Ces. et D N.	62
<i>commutata</i> Fuck.	19	<i>finiseda</i> D N.	63
<i>compressum</i> (Pers.)	52	<i>flacca</i> (Wallr.)	44
compressus Rehm	60	<i>flammea</i> (Alb. et Schw.)	23
<i>conferta</i> Awd.	61	<i>flavorivens</i> (Hoffm.)	36
<i>confluens</i> . Tul.	4	Fleischhackii Awd.	64
<i>conica</i> Fuck.	63	<i>Franzonianum</i> De N.	4
<i>Coniothyrium</i> (Fuck)	56	<i>fructigenum</i> (Bull.)	7
<i>conoidea</i> Niessl	52	<i>Fruticum</i> (Rob.)	60
<i>convexellum</i> (Karst.)	8	Fuckelii Duby	39
<i>coprinaria</i> (Cooke)	1	<i>funiculata</i> Fuck.	64
<i>coprophila</i> (Fr.)	63	<i>furfuraceus</i> Pers.	31
<i>coprophila</i> Fuck.	62	<i>fusarioides</i> (Berk.)	17
<i>coronata</i> Niessl	53	<i>fusca</i> (Pers)	12
<i>corrugatum</i> Koerb.	46	<i>fuscoatra</i> Hazsl	22
<i>corruscans</i> Norm.	29	<i>fuscum</i> (Pers.)	33
<i>corticalis</i> (Pers.)	23	Glaber Fuck.	31
<i>crenatum</i> (Pers.)	51	glaber Karst.	31
<i>cubicularis</i> Fuck.	25	glaciale Rehm	51
<i>Cucurbitula</i> (Tode)	42	glanduliforme Rehm	5
<i>culmigenum</i> Fr.	26	gramineum Moug.	26
<i>curvula</i> de By	63	granulatus Fuck.	2
<i>cyanogena</i> Desm.	44	<i>granuliformis</i> (Crouan)	30
<i>cyathoideum</i> (Bull.)	5	<i>Herbarum</i> (Pers.)	6
<i>Cypri</i> (Tul.)	38	<i>hirsuta</i> Fr.	58
<i>Dacrymycella</i> (Nyl.)	44	<i>hispidula</i> (Tode)	58
<i>decipiens</i> Wint.	62	<i>Hoffmanni</i> Tul.	36
<i>decorticans</i> (Fr.)	38	<i>humilis</i> Desm.	6
<i>deflectens</i> Karsten	52	<i>Humuli</i> (Lasch)	6
<i>depauperatus</i> (Berk. et Br)	31	Hungarica Rehm	13
diaphana Rehm	16	<i>Immersus</i> Pers.	32
<i>dispersa</i> D N.	44	<i>inaequalis</i> (Curr.)	39
<i>diversicolor</i> Fr.	30	<i>incrustans</i> Nke	39
<i>Doliolum</i> (Pers.)	55	<i>inquinans</i> (Tode)	57
<i>Elegans</i> Thümen	54	<i>insidiosum</i> (Desm.)	50
<i>elongata</i> (Fr.)	45	<i>insitiva</i> Ces.	34
<i>episphaerica</i> (Tode)	42	<i>intermedia</i> Awd	64
<i>equina</i> Müll.	30	Iridis Rehm	16
<i>erythrinella</i> Nyl.	44	Kalchbrenneri Fuck.	44
<i>Fascicularis</i> (Alb. et Schw.)	20	Kerverni (Crouan)	30
<i>fimbriata</i> Chaill.	22	Kerverni Karsten	31
<i>Fimeti</i> Cooke	61		
<i>Fimeti</i> Fuck.	61		

Laeve Awd.	64	mytilinellum Karst.	25
lageniforme Sollm.	25	<i>mytilinum</i> (Pers.)	25
lanata Rehm	9	<i>Napelli</i> (Ces.)	40
lanuginosa Preuss.	62	nivea Fuck.	11
laricinum Fuck.	22	<i>Notarisii</i> Fuck.	59
Lecanactis Mass.	18	nummularia DC.	34
<i>lecanodes</i> Ces.	41	<i>Obesa</i> Dur.	54
Lecanora Schm. et Kze	16	<i>ocellata</i> Pers.	16
<i>lecideola</i> (Fr.)	19	<i>omphalodes</i> (Bull.)	4
<i>lejioplaca</i> (Fr.)	36	Ononidis Awd	60
lenticulare Fuck.	4	Orni Rehm	37
leptideum Fr.	24	<i>ovina</i> (Pers.)	58, 65
leucomela DC	22	Papillatus Wallr.	30
<i>leucophaea</i> (Pers.)	9	<i>parallela</i> (Ach.)	28
leucostoma Rehm	10	parvula Speg.	16
<i>lichenicola</i> (Ces.)	44	<i>Passerinii</i> Sacc.	54
<i>lichenicola</i> DN.	44	<i>Patella</i> (Tode)	22
<i>lichenicola</i> Sacc.	44	<i>patellaria</i> Pers.	18
lichenoides Rehm	47	<i>Peltigerae</i> Fuck.	20
<i>Ligni</i> (Desm.)	14	<i>Peltigerae</i> Nyl.	19
lignyota Fr.	20	Peltigerae Ph. et Pl.	44
Ligustici DC.	22	<i>pertusum</i> (Pers.)	48
lineare (Fr.)	27	<i>perversum</i> DN.	49
lineare Rehm	26	Peziza Tode	41
lividofusca Fr.	12	pezizoides Zopf.	11
luctuosa Cooke	15	phaeotricha Rbh.	11
<i>luteopallens</i> (Nyl.)	2	picastra Fuck.	47
<i>Lycii</i> (Duby)	46	<i>pilosus</i> (Fr.)	30
<i>Macrospora</i> (Fuck)	57	<i>Pinastri</i> (Pers.)	23
macrospora Karst.	28	<i>Pinastri</i> Tul.	21
macrosporus Cronan	32	<i>Pinetorum</i> Fuck.	59
<i>macrostomoides</i> DN.	50	<i>pinicola</i> (Rebent.)	28
<i>macrostomum</i> (Tode)	49	pinicola Rehm	48
mammillana Fr.	54	<i>pithyophila</i> (Kze et Fr.)	45
Marianum Carus		plicata Rehm	14
Maydis Rehm	23	podoides Wallr.	36
melaspermella Nyl.	19	<i>Polygoni</i> (Cooke)	15
<i>mimima</i> Awd.	64	polymorpha Rehm	57
<i>mimima</i> Fuck.	57	Populi Lasch.	16
<i>minuta</i> Fuck.	62	populnea Pers.	20
minutissima Rehm	42	<i>profusa</i> (Fr.)	41
minutula Koerb.	29	propolidoides Rehm	24
<i>mirabilis</i> Fuck.	63	<i>Prunastri</i> Fr.	21
<i>modesta</i> Desm.	54	<i>Pruni</i> Fuck.	37
<i>mollissima</i> (Lasch.)	10	<i>pseudomacrostomum</i> Sacc.	49
<i>moriformis</i> (Tode)	46		
<i>Morthieri</i> Fuck.	47		

<i>pulcaris</i> (Fr)	43, 44	<i>Strickeri</i> Koerb.	19
<i>punctata</i> (L.)	33	<i>subcompressum</i> Karst.	52
purpurea Rehm	54	<i>suecica</i> Fuck	9
<i>pyrenopezizoides</i> Speg. et Sacc.	55	<i>sulphurea</i> Fr.	9
<i>pyrrhochlora</i> (Awd.)	41	<i>sulphurea</i> Fuck.	9
<i>Quadratus</i> (Schmitt és Kze)	24	<i>superflua</i> (Awd)	59
<i>quadrinucleatum</i> Karst.	49	<i>Syringae</i> Nke	37
<i>quercinum</i> (Pers)	25	Syringae Rehm	20
<i>Racodium</i> (Pers.)	58	<i>syringea</i> Wallr.	11
<i>relicina</i> (Fr.)	10	<i>Tarzetta</i> Cooke	3
<i>repanda</i> (Wahlb.)	3	<i>tenuis</i> Fuck.	1
<i>resinaria</i> (Cooke et Ph)	11	<i>terrestris</i> Thümen	58
Robergei Desm.	44	<i>tessera</i> (Fr.)	39
rosella Rehm	16	<i>tetrasporum</i> Fuck.	8
<i>rubellus</i> (Pers.)	60	<i>thelebolooides</i> (Alb. et Schw)	1, 2
rubicunda Rehm	53	<i>tortile</i> (Schwe'n.)	26
<i>rubra</i> Cooke	2	Transylvanica Rehm	47
<i>rubra</i> Fuck.	17	Tyrolensis Rehm	13
<i>rubricosum</i> Fr.	35	<i>umbrata</i> Cooke	3
<i>rufum</i> (Pers.)	24	<i>umbrorum</i> Fuck.	2
<i>Saccharinus</i> Boud.	29	<i>unica</i> Desm.	25
<i>Sambuci</i> (Pers.)	40	<i>unicaudata</i> (B et Br)	52
<i>saprophila</i> Fw.	18	<i>Urticae</i> (Pers)	7
<i>Sarothamni</i> Nke	39	<i>vagans</i> Sacc.	40
<i>Saubinetii</i> (Dur. et Mont)	44	<i>varians</i> Hazsl.	46
<i>scabra</i> Awd.	59	<i>versicolor</i> Karst	31
<i>scabra</i> Curr.	59	<i>vestitum</i> (Fr.)	40
<i>scotophila</i> Sacc	53	<i>vicinellum</i> Sacc	49
<i>Seiridii</i> B. et Br.	41	<i>villosa</i> (Pers.)	11
<i>seriatum</i> Lib.	26	<i>vinosa</i> (Alb. et Schw.)	17
<i>setosa</i> Niessl	54	vinosula Rehm	18
<i>simillimum</i> Karst.	50	<i>violascens</i> Boud.	31
<i>Solani</i> Pers.	5	<i>Virgultorum</i> DC.	27
<i>spilomatica</i> (Anzi)	29	<i>Virgultorum</i> (Vahl.)	7
<i>spiniferum</i> (Wallr.)	35	<i>Vitis</i> Hazsl.	37
<i>spinosa</i> (Pers.)	35	Vitis Rehm	15
<i>Stephensoniana</i> Ellis	3	<i>vulgare</i> Corda	64
<i>stercoraria</i> Bull.	31	<i>vulgaris</i> DN.	5
<i>Stigma</i> (Hoffm.)	35	<i>vulgaris</i> Niessl	53
<i>striata</i> Fr.	7		



